

ମୋଟୋ


(କ) ଅଗ ଫଳ ପତା (Blossom End Rot)



(ଖ) ଅସାଧାରଣ ଆକୃତି (Cat face)




(ଗ) ଫଳ ଫାଟିଯିବା (Fruit Cracking)



(ଗ)* ଡେମ୍ଫରୁ ଚଳିଯାଇଥିବା ଲମ୍ଫାକାର (Radial Cracking)

(ଗ)* ଡେମ୍ଫ ଚାରିପଟେ ଗୋଲେଇ ଆକାର (Concentric Cracking)

(ଘ) ଅସମାନ ବା ଅନିୟମିତ ଫଳ ପାଟିବା (Blotchy Ripening)



ଆଳୁ

(କ) ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଆଳୁ (Greening)



(ଖ) ଫମ୍ପା ଆଳୁ (Hollow heart)



ପତ୍ତିପରିବା ଚାଷରେ

ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅସ୍ବାଭାବିକ ବିକାର

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷିମାନେ ଧାନ ଚାଷ ପରେ ପତ୍ତିପରିବା ଚାଷକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଆଜ, ଆଳୁ, ମୋଟା, ବାଇଗଣ, ଫୁଲକୋବି, ଚଉକୁଜ, ପୋଳେ, ଭେଣ୍ଟି, କଖାରୁ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଇଗଣ ୫୩୯ ହେକ୍ଟର, ମୋଟା ୩୪୭୫ ହେକ୍ଟର, ପିଆଜ ୧୩୯୪ ହେକ୍ଟର, ଚଉକୁଜ ୧୦୨ ହେକ୍ଟର, କଖାରୁ ୨୪୮ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ କରି ଚାଷି ଚାର ଆର୍ଥିକ ଆୟ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ପତ୍ତିପରିବା ଚାଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଓ ପୋକ ମାନଙ୍କର ପାର୍ବତ୍ୟବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ହାର କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ପୋକ ବ୍ୟତିତ ଫସଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କେତେକ ଆକାଂଶକାରୀ କାରଣ ପାଣିପାଗର ଅନିୟମିତତା ବା କେତେକ ଦରକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଅଭାବରେ କେତେକ ଅସ୍ବାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଅସ୍ବାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ପତ୍ତିପରିବାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ପାଦନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆକୃଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମୟରେ ଘଟିପାରେ । ସାଧାରଣତଃ ଚାଷିଭାଇମାନେ ଏହି ସବୁ ବିକାର ପାଇଁ ସତେଜ ନଥାନ୍ତି ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ତିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ହାର କମାଇଥାଏ । ଅସ୍ବାଭାବିକ ବିକାରକୁ ରୋଗ ପୋକରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କରି ଅଧିକ କାଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାରରେ ଅଯଥା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ଚାଷି ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ପତ୍ତିପରିବା ଚାଷରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ବାଭାବିକ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚାଷି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପୁସ୍ତିକା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ।

୧) ମୋଟା

(କ) ନୁସ୍‌ମ୍ ଏଣ୍ଡର ବା ଅଗ ଫଳପତା (Blossom End Rot)

ଲକ୍ଷଣ- ଜଳଦି ବହୁଥିବା ପୋକ ଏବଂ ପାଟିଲା ମୋଟାରେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ବିକାର । ଅସ୍ବାଭାବିକ ବିକାର ଯେଉଁଥିରେ ଫଳର ଚଳଭାଗ ତଥା ଡେମ୍ଫର ବିପରିତ ଭାଗ ଦୃଢ଼ିକା କଳା ପଡ଼ିଯାଏ । ଡେମ୍ଫର ବିପରିତ ଭାଗରୁ ଏହା ଏକ ହାଲୁକା ବାଦାମୀ ତମ୍ବା ରଙ୍ଗର ପାଣି ଶୋଷିଥିବା ରଙ୍ଗହୀନତା ଦାଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦାଗଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ବଡ଼େ ଏବଂ ଧିରେ ଧିରେ କଳାପଡ଼ି ଚମଡ଼ା ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ଦାଗଟି ପଡ଼ିଯାଏ ।

କାରଣ- କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ଅଭାବରେ ଡେମ୍ଫର ବିପରିତ ଭାଗ ତଥା ଫଳର ଚଳଭାଗରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିକାର ଦେଖାଯାଏ । କାରଣ କ୍ୟାଲସିୟମ ମୋଟେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମାଟିରେ ପାଣିର କମ୍ ବେଶ୍ ହେଲେ, ଗଛକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ହୁଏ ।

ପରିଚାଳନା- ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟସାର, ପାଣି ଏବଂ ଫଳ ପତାକୁ ସହଣ ଶକ୍ତି ଥିବା ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଅସ୍ବାଭାବିକ ବିକାରକୁ ଗଛ ଲାଗାଇବାର ୨-୪ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମାଟିରେ ଚୂନ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ ।

(ଖ) ଅସାଧାରଣ ଆକୃତି ବା ଫଳ ଉପରେ କଟାଦାଗ (Cat Face)

ଲକ୍ଷଣ- ଫଳର ଚଳଭାଗ ବା ଡେମ୍ଫର ବିପରିତ ଭାଗ ଦ୍ୱିପ ଓ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ବା ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦାଗ ହୋଇ

ଅଧ୍ୟାୟ ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଏ ଯାହାକି ଛୋଟ ବିଲେଇର ମୁହଁ ପରି ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକାର ବିକାର ନୂଆ ଫଳୁଥିବା ଫଳରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ହେତୁ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା କମିଯାଏ ।

କାରଣ- ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ ଚାପମାତ୍ରା ଦେଖାଦେଲେ ଗର୍ଭକୋଷରେ ବିକୃତ ଦେଖାଯାଏ । ଯାହାଫଳରେକି ଗର୍ଭାଶୟ କିମ୍ବା ଡିମ୍ବାଶୟ କୋଷ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଫଳର ଶେଷ ଭାଗରେ କଳା ଓ ଚମଡ଼ା ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା- ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମାଟିର ଜଳର ପରିମାଣ ଠିକ୍ ରଖିବା ଜରୁରୀ । କମ୍ ଚାପମାତ୍ରାରେ ଏହା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । କିନ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ଚାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ଧିରେ ଧିରେ ଉଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁରେ ଫଳର ଆକୃତି ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ ।

(ଗ) ଫଳ ଫାଟିଯିବା (Cracking)

ଲକ୍ଷଣ- ଟମାଟୋରେ ତେଜ୍ ଫଳକୁ ଫାଟିବା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯାହାକି ବଜାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ କଞ୍ଚା ଓ ପାକଳ ଫଳ ଠାରୁ ପୁରା ପାଟିଲା ଫଳରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ଟମାଟୋରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଫାଟିବା ଦେଖାଯାଏ । ପ୍ରଥମତଃ ପାଟିଲା ଫଳରେ ଡେମ୍ଫଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡେମ୍ଫର ଚଳ ଭାଗକୁ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଫଳ ଫାଟିଯାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି କଞ୍ଚାଫଳରେ ତେଜ୍ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଲେଇ ଆକାରର ଫଳ ଫାଟିଥାଏ ।

କାରଣ- ଫଳ ଫାଟିବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ, କାରଣ ରହିଛି, ଯେପରିକି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଶୁଷ୍କ ରହିବା ସହିତ ହଠାତ୍ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ, ଚାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବୋରନ୍ ଭଳି ଅଣୁସାର ଅଭାବରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା- ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଫଳ ଫାଟିବାକୁ ସହଶକ୍ତି ଥିବା କିସମର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ଯାହାର ଉପର ଚୋପା ମୋଟା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଅଂଶ କମ୍ ଥିବ । ଫଳଫାଟିବା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଳସେଚନ ଆହୁତନର ବ୍ୟବହାର, ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜବକାରଜାନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟସାରର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବା ଏବଂ ମାଟିରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୫-୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବୋରାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଫଳ ଫାଟିବା ୨-୩ ଗୁଣା କମିଯାଏ ।

(ଘ) ଅସମାନ/ଅନିୟମିତ ଫଳ ଫାଟିବା (Blotchy ripening)

ଲକ୍ଷଣ- ଟମାଟୋ ଫଳର ଉପରିଭାଗରେ “ଲାଲକୋପିନ୍” ନାମକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ରଞ୍ଜକର ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହେଲେ ଫଳ ଠିକ୍ ସେ ପାଚେ ନାହିଁ ଏବଂ ଫଳର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅସମାନ ପାଟିଥାଏ ସେହି ଅଂଶଟି କାଟିଲେ ବାଦାମ୍ବି ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଟମାଟୋ ଫଳ ଉପରେ ହଳଦିଆ ବା ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ।

କାରଣ- ଟମାଟୋ ଚାଷରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ ନକଲେ, ଆବଶ୍ୟକ ମୃତାବଳ ଖାଦ୍ୟସାର ବିଶେଷକରି କମ୍ ପତାସ ସାରର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଦିର୍ଘ ଶୁଖିଲା ପାଗ ପରେ ଜଳସେଚନ ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ।

ପରିଚାଳନା- ଫଳରେ “ଲାଲକୋପିନ୍” ରଞ୍ଜକର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ, ଖାଦ୍ୟ ସାର ପରିଚାଳନା ସହିତ ଗଛର ବୃଦ୍ଧିରେ ଚାରତମ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲେ ସମାନ ଭାବରେ ଫଳ ଫାଟିବା ଦେଖାଯାଏ ।

(ଝ) ଫମ୍ପା ଫଳ (Puffiness)

ଲକ୍ଷଣ- ଟମାଟୋରେ ଫମ୍ପା ଫଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ଯାହାକି ବାହାରୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳର ଭିତର ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକଶିତ ନହୋଇ ଫମ୍ପା ହୋଇଯାଏ । ଫମ୍ପାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହାଲକା, ନରମ ଓ ତେପତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

କାରଣ- କୋରନ୍, ଅଣୁସାରର ଅଭାବରେ ସଠିକ୍ ପରାଗସଙ୍ଗମ, ପ୍ରଜନନ ବା ସମାୟନ ନ ହୋଇ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି ବୃଦ୍ଧି ନହେବା, ଅଧିକ ଚାପମାତ୍ରା କମ୍ ପତାସ ଏବଂ ଅଧିକ ଯବକାରଜାନ ସାର ତା ସହିତ ଅନ୍ତ ଜଳବାୟୁରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା- ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ ସ୍ଥିର ଚାପମାତ୍ରା ସହିତ ବୋରାକୁ (୧୦-୧୫ ମିଲି ଗ୍ରାମ/ଲିଟର) ପ୍ରୟୋଗ ଫଳକୁ ଫମ୍ପା ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।

୨) ଆଳୁ

(କ) ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଆଳୁ (Greening)

ଲକ୍ଷଣ- ଆଳୁର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଦେଖାଯିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଆସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାର ଯାହାକି ଆଳୁ ବୃଦ୍ଧିର ଯେକୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯେପରିକି ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଜମିରେ ଥିବା ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅମଳପରେ ଆଳୁ ସରକ୍ଷଣ ସମୟରେ ହେଉ । ଏହା ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ପ୍ରଥମତଃ ଆଳୁର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଯୋଗୁ ଏହା ବିକ୍ରି ଅନୁପଯୋଗୀ ହୁଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଳୁରେ ଜମା ହୋଇରହିଥିବା “ସୋଲାନିନ୍” ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ । (୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଆଳୁରେ ସୋଲାନିନ୍ର ପରିମାଣ ୨୦ ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଏହା ଖାଇବା ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ।)

କାରଣ- ଆଳୁର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହେବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଜମିରେ ଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଆଳୁର ଉପରିଭାଗରେ “କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍” ଭଳି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରଞ୍ଜକ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଏବଂ “ସୋଲାନିନ୍” ଭଳି ବିଷକାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଜମାହୋଇଥାଏ । ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ପଟାଳିରେ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଗଭିରତା ଅନୁସରଣ ନ କଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ପରିଚାଳନା- ଆଳୁକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ପଟାଳିରେ ସଠିକ୍ ଗଭୀରତାରେ (୧୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର) ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଲଗାଇବାର ୪୦ ଦିନ ପରେ ଜମିରେ ଛୁଡ଼ା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଉନ୍ନତ ମାନର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତିକି ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଷୟକୁ ରୋକାଯାଇ ଆଳୁକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ।

(ଖ) ଫମ୍ପା ଆଳୁ (Hollow heart)

ଲକ୍ଷଣ- ଆଳୁର ମଝି ଅଂଶଟି ଅନିୟମିତ ଭାବେ କଣା ହୋଇ ତାର ଚାରି ପାଖ ବାଦାମ୍ବି ରଙ୍ଗ ବିହନ ଦେଖାଯାଏ । ବାହାରୁ ଆଳୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁକୁ କାଟିଲେ ହିଁ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ କୁପ୍ତି-ସିନ୍ଦୂରୀ କିସମରେ ଦେଖାଯାଏ କାରଣ ଏହି କିସମର ଆଳୁ ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ।

କାରଣ- ଅଧିକ ଯବକାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ଆକର୍ଷିକ ଭାବେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାରୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ମଝି ଅଂଶଟି ଫମ୍ପା ରହିଯାଏ ଏବଂ ଖୋଲୋ ପାତ୍ର ପରି

ପରିଚାଳନା- ଅଧିକ ଯତ୍ନାବଳୀର ସାଗର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଇ ମାଟିର ଆକୃତି ଠିକ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

(ଗ) କଳା ଆଳୁ (Black Heart)

ଲକ୍ଷଣ- ଆଳୁର ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଳୁ ଅମଳ ପରେ ସଂରକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ । ଆଳୁକୁ ଗଦା ଗଦା କରି ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଯାହାଫଳରେ ଗଦା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନର ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ଆଳୁର ଜଳାନ୍ତରାଣ ଯୋଗୁଁ ଆଳୁର ଭିତର ଅଂଶଟି କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ।

କାରଣ- ଆଳୁକୁ ଗଦା ଗଦା କରି ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ । ଅନ୍ତରକ୍ଷଣ ଗଛକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରି ସାବଧାନର ସହିତ ଅନ୍ତରକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ପରିଚାଳନା- ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଳୁ ସରକ୍ଷଣ ଘରେ ସଠିକ୍ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁକୁ ଗଦା କରି ନ ରଖି ସମାନ ଭାବରେ ଚଟାଣରେ ବିଛାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

(ଘ) ଅସାଧାରଣ ଆକୃତି (Knobbiness)

ଲକ୍ଷଣ- ଆଳୁର ଉପରିଭାଗରେ ଅସମାନତା ଏବଂ ଅସାଧାରଣ କୋଷ ବୃଦ୍ଧି ଯାହାକି ଆଳୁର ଆକୃତିକୁ ବଦଳାଇଥାଏ ଏବଂ ବିକୃତି ଅନୁପ୍ରୟୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ।

କାରଣ- ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଜଳ ସେଚନର ଅଭାବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଶୁଖିଲା ପାଗ ପରେ ହଠାତ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜଳସେଚନ ଆଳୁ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ପରିଚାଳନା- ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ପାଗ ଦେଖି ଜଳସେଚନ କଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନିରାକରଣ କରିହେବ ।

(ଘ) ଫୁଲକୋଟି

(କ) ରାଇସିନେସ୍ / ଧଳା ଗୁମ ପଣ (Riceyness)

ଲକ୍ଷଣ- କୋଟିର ଉପରିଭାଗରେ ଫୁଲ କଢିର ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଧଳା ଧଳା ଗୁମ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ଯାହାକି ବହୁତ ନରମ ଚୁକାପରି ହାତକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ଏହା ହେଲେ ଫୁଲର ଆକାର ଛୋଟ, ହାଲୁକା, ଫସଫସିଆ ହୋଇଥାଏ ଓ ବଜାର ଅନୁପ୍ରୟୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ।

କାରଣ- ଚାପମାତ୍ରାରେ ତାରତମ୍ୟ ନରହିଲେ ଏବଂ ଆକୃତି ବୃଦ୍ଧି, ବିକଳ ଅମଳ, ବିକଳ କିସମ ଫୁଲକୋଟିକୁ ସଫଳ ଲଗେଇଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଯତ୍ନାବଳୀର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା- ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍ କିସମ ଲଗାଇବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅମଳ କରିବା ଓ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ଯତ୍ନାବଳୀର ସାଗର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରାଯାଇପାରେ ।

(ଖ) ଫୁଲକୋଟିରେ ସବୁ ପତ୍ର ବାହାରିବା (Whiptail)

ଲକ୍ଷଣ- ଫୁଲକୋଟିର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନମେଲି, ଛୋଟ, ସରୁ, ହାଲୁକା ରଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଖାଲି ମଝି ଶିରାଟି ବିକଶିତ ହୋଇ ଲାଞ୍ଜ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ

“ସୁଲପହେଲ” ନାମରେ ଜଣାଯାଇଛି ।

କାରଣ- ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ଫୁଲକୋଟି ଚାଷ କଲେ ମଲିବିଡ଼େନମ୍ ଅଣୁସାର ଅଭାବରେ ଏହି ଅସ୍ୱଭାବିକ ବିକାର ଦେଖାଯାଏ କାରଣ ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ଗଛକୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ମଲିବିଡ଼େନମ୍ ଲପଲକ୍ଷ ହୋଇନଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା- ଫୁଲକୋଟି ଚାଷ ସମୟରେ ମାଟି ଯଦି ଅମ୍ଳ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସୋଡିୟମ୍ ମଲିବିଡ଼େଟ୍ ଖାଦ୍ୟସାର ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୦-୧୫ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ।

(ଗ) ଛୋଟ ଫୁଲ (Buttuning)

ଲକ୍ଷଣ- ଫୁଲକୋଟିର ଫୁଲର ବୃଦ୍ଧି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରେନି ଯାହା ଫଳରେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ । ଏହା କୋଟିର ଗୁଣ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ କମାଇଦିଏ ଯାହାକି ଉତ୍ତମ ଖାଇବା ଏବଂ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରୟୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ।

କାରଣ- ଅଧିକ ବୟସ ଚଳି ବା ଦୁର୍ବଳ ଗୁଡ଼ା ଚଳି ମାଟିରେ କମ୍ ପରିମାଣର ଯତ୍ନାବଳୀର ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରୟୋଗ, ଅମଳ କିସମ ବିକଳରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା- ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଯତ୍ନାବଳୀର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଚାଉ ଲଗାଇବାରେ ବିକଳ ନକରି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ଚାଉ ରୋପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

(ଘ) ଫୁଲ ନ ଫୁଟିବା (Blindness)

ଲକ୍ଷଣ- ଫୁଲକୋଟିର ବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶ ଯାହାକି ଫୁଲ ନ ଫୁଟି ଗାଡ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବଡ଼ ଓ ମୋଟା ଚମଡ଼ା ଭଳି ପତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ।

କାରଣ- ମାଟିର ଅନୁର୍ବର ଅବସ୍ଥା, ଅଳ୍ପ ଜଳବାୟୁ ଫୁଲ ଫୁଟିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ବିନା ଫୁଲରେ କୋଟି ଗଛଟି ବଢ଼େ ।

ପରିଚାଳନା- ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଗୁଣବତ୍ତା ଚାଉର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ତରକ୍ଷଣ ଗଛକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରି ସାବଧାନର ସହିତ ଅନ୍ତରକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

(ଙ) ଖୋଲା ଫୁଲ ଫୁଟିବା (Loosening)

ଲକ୍ଷଣ- ଫୁଲକୋଟି ପକଡ଼ା ସମୟରେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ବାନ୍ଧିହୋଇ ନ ରହି ଖୋଲା ଖୋଲା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଫୁଲର ଉପରିଭାଗରେ ନରମ ଗୁମ ଉଠିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ।

କାରଣ- ଅତିନିଆ ଫୁଲକୋଟି ଚାଷ ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାଷ ଏବଂ ବିକଳରେ ଅମଳ କରିବା ଏପରି ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଅଟେ ।

ପରିଚାଳନା- ଉନ୍ନତ ମାନର ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ଚାଷ ପରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଅତିନିଆ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସଠିକ୍ ଚାଷ ପଛଟି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

(ଠ) ଗାଜର

(କ) ଗାଜର ଫାଟିବା (Cracking)

ଲକ୍ଷଣ- ଫୁଲ ଜାତୀୟ ପରିବାରେ ଫଳ ଫାଟିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । ଏହି ସମସ୍ୟା ଛୋଟ ଫୁଲଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଲରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଗାଜର ଫାଟିଯାଇ ବିକ୍ରି

ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ।

କାରଣ- ଦିର୍ଘ ଅନାବୃତ୍ତି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ କାରଣ ତା ଛଡ଼ା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟସାର ବିଶେଷ କରି ଆମୋନିଆ ପ୍ରୟୋଗରେ ଏହି ସମୟା ବୃଦ୍ଧିପାଏ।

ପରିଚାଳନା- ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ଯେମିତିକି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିମାଣର ଜଳସେଚନ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଆମୋନିଆ ବିହୀନ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟସାର ଏବଂ ଗଛରୁ ଗଛ ବ୍ୟବଧାନ ଠିକ୍ ରଖିଲେ ଏହି ସମୟାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ।

(ଖ) ଗାଜରରେ ଖଣିଆ ଦାଗ (Cavity Spot)

ଲକ୍ଷଣ- ଗାଜରର ଉପରିଭାଗରେ ଖଣିଆ ହୋଇ ଭଳି ଛିଦ୍ର ହୋଇ କଳା କଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଦାଗ ଧିରେ ଧିରେ ବଢ଼ି ବଡ଼ ଆକାରର ହୋଇ ଝଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ।

କାରଣ- ମାଟିରେ ପତାସ ଖାଦ୍ୟସାରର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଲେ ଏହା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଣୁସାରକୁ ଗଛ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାର ଅଭାବରେ ଏହି ସମୟା ଦେଖାଯାଏ।

ପରିଚାଳନା- ମାଟିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଣୁସାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଗାଜରରେ ଏହି ସମୟା କମିଯାଏ।

(ଗ) ଗାଜର ଓ ମୂଳାରେ ଦିଶାଖା ସମୟା (Forking)

ଲକ୍ଷଣ- ଉଭୟ ଗାଜର ଓ ମୂଳାରେ ଏହି ଦିଶାଖା ସମୟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ଗାଜର ଓ ମୂଳାର ମୂଳ ସିଧାସଳଖ ନ ବଢ଼ି ମୂଳ ଦିଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅଧିକ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଢ଼ିଥାଏ ଯାହାକି କଣ୍ଟା ଗାମଚ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ।

କାରଣ- ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟସାରରେ ଗୋବରର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଡୁଡ଼ ଓ ଘନ କଠିନ ମାଟିରେ ଗାଜର ଏବଂ ମୂଳା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସମୟା ଦେଖାଯାଏ।

ପରିଚାଳନା- ଗାଜର ଓ ମୂଳାକୁ ବାଲିଆ ମାଟି ଯାହାକି ହାଲୁକା ଏବଂ ସହଜରେ ମୂଳ ବଢ଼ିପାରୁଥିବା ମାଟିରେ ଚାଷ କରାଯିବା ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ ଜଳସେଚନ ତଥା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

(ଃ) ଚରଭୁଜ

(କ) ଅଗ ଫଳପତା (Blossom End-Rot-BER)

ଲକ୍ଷଣ- ଫଳର ତଳଭାଗରେ ତଥା ଡେମ୍ଫର ବିପରୀତ ଭାଗରେ କଳା ରଙ୍ଗର ମାଉଁସିଆ ଚମଡ଼ା ଅଂଶ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଚମଡ଼ା ଅଂଶ ଧିରେ ଧିରେ ଫଳର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଫଳର ଅଗ୍ରଭାଗ ପତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।

କାରଣ- ଦିନେ ଛାତି ଦିନେ ଓଦା ଶୁଖିଲା ମାଟିର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଭଳି ଖାଦ୍ୟସାରର ଅଭାବରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ।

ପରିଚାଳନା- ମାଟି ଉପରେ ଆହ୍ଲାବନର ବ୍ୟବହାର, ମାଟିରେ ଜଳର ପରିମାଣ ଠିକ୍ ରଖି। ସଠିକ୍ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାରର ବ୍ୟବହାର ନକରି, ବୃଦ୍ଧା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲେ ସମୟା କମିଥାଏ।

(ଖ) ଚରଭୁଜର ଫମ୍ପାଫଳ (Hollow Heart)

ଲକ୍ଷଣ- ପାଚିଲା ଚରଭୁଜକୁ କାଟିଲେ ଫଳର ଭିତର ଅଂଶଟି ଫାଟିବା ଆକାରର ଦେଖାଯାଏ।

କାରଣ- ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନହେବା ସହିତ ଜଳଜି ଫଳ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଫଳଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଳଜି ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁ ଫଳର ଭିତର ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନବଢ଼ି କିଛି ଅଂଶ ଫମ୍ପା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ।

ପରିଚାଳନା- ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫସଲ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଜଳନ ବା ସମୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।

୧. ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ

(କ) ପିଆଜର ଷଣ୍ଢା ବାହାରିବା (Bolting)

ଷଣ୍ଢା ବାହାରିବା ପିଆଜ ଫସଲର ଏକ ସମୟା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତଳି ରୋଇଲେ ଅଧିକ ଷଣ୍ଢା ବାହାରିଥାଏ। ରୋଇବାର ୧୦ ଦିନ ପରେ ପିଆଜ ଗଛର ମଝି ଭାଗରେ ଶକ୍ତ କାଣ୍ଡ ସହିତ ଫୁଲପାଖୁଡ଼ା ବା ଷଣ୍ଢା ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ।

କାରଣ- ଅଧିକ ବୟସର ପିଆଜ ଚାରା ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ବୁଣିବା ଯାହାକି ଛୋଟ ପିଆଜ ତିଆରି କରେ। ସମୟପରେ ଚାରା ଲଗାଇବା, ପିଆଜ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବା (୧୦-୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍) କିମ୍ବା କମ୍ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରୟୋଗରେ ପିଆଜ ଷଣ୍ଢା ବାହାରିଥାଏ।

ପରିଚାଳନା- ପିଆଜ ଷଣ୍ଢା ବିକ୍ରି କରି ଚାଷି ପଛସା ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଷଣ୍ଢା ଯୋଗୁଁ ପିଆଜର ଅମଳ କିମ୍ବା ଏବଂ ଚାଷି କ୍ଷତି ସହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ଚାରା କିମ୍ବା ଉନ୍ନତ ବିହନ ବୁଣିବା ସହିତ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଷଣ୍ଢା ବନ୍ଦ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୫ ଗ୍ରାମ୍ ମାଲିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋକାଲଡ୍ ମିଶାଇ ରୋଇବାର ୩୫ ଦିନ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

(ଖ) ପିଆଜ ଓ ରସୁଣରେ ଗଜା ବାହାରିବା (Bulbsprouting)

ଲକ୍ଷଣ- ଉଭୟ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାର। ପିଆଜ ଓ ରସୁଣର ସଂରକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଗଜା ବାହାରିବା ଚାଷିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟା।

କାରଣ- ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପିଆଜ ଅମଳ ସମୟରେ ମାଟିର ଜଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବା ଫଳରେ ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏହା ଗଜା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ।

ପରିଚାଳନା- ଚାରାରେପଣ ସମୟ ଏମିତି ସମୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯେପରିକି ଶୁଖିଲା ସମୟରେ ପିଆଜ ଅମଳ କରାଯାଇପାରିବ। ପିଆଜ ଅମଳ ହେବା ସମୟ ଆସିଲେ ଜଳସେଚନ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହିତ ବୋରାକୁ (୫୦୦-୧୦୦୦ ମି.ଲି. ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର) ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୨-୩ ଥର ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହାକୁ ରୋକି ହେବ। କିମ୍ବା ଅମଳର ୧୫-୨୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍ ମାଲେଇକ୍ ହାଇଡ୍ରୋକାଲଡ୍ (Maleic Hydrozide) ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଫସଲକୁ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଅମଳ ପରେ ପିଆଜ ଗଜା ନହୋଇ ବେଶିଦିନ ସାଜତି ରଖି ହୁଏ।

(କ) ଅଗ ଫଳପତା (Blossom-End Rot)

ଲକ୍ଷଣ- ଲଙ୍କାର ଅଗଭାଗରେ ପାଣି ଶୋଷିଥିବା ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଦାଗଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ କଳା ପଡ଼ି ଦବିଯାଏ ଏବଂ ଫଳ ପରିଗଳା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ।

କାରଣ- ଫଳରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଣୁସାର ଅଭାବରେ ଫଳ ପରିଯାଏ ଯାହାକି ମାଟିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଣୁସାରର ପରିମାଣ କମ୍ ଯୋଗୁ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ମାଟିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା ଫଳରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା- ଏକାଥରେ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ନକରି ଦିନେ ଛାତି ଦିନେ ହାଲକା ଜଳସେଚନ ସହିତ ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରୟୋଗ ନକରି ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଛଡା ମାଟିରେ ତୁନ ପ୍ରୟୋଗ କିମ୍ବା ଗଛରେ ଆନୁହାଜତ୍ୱ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

ପରିପରିବାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାର ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫସଲର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଫସଲରେ ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟସାର ଅଭାବରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାର ଏହାର ସଠିକ୍ ନିରୂପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଳବାୟୁକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇ ଅନୁମୋଦିତ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶକୁ ସୁଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପରିପରିବା ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାରକୁ ଚାଷି ରୋକି ପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିବ ।

ଆଳୁ

(ଗ) କଳା (Black heart)



(ଘ) ଅସାଧାରଣ ଆକୃତି (Knobbiness)



ଫୁଲକୋରି


(କ) ରାଇସିନେସ୍ / ଧଳାଗୁମ୍ ଦାଗ (Riceyness)




(ଖ) ଫୁଲକୋରିର ସରୁପତ୍ର ବାହାରିବା (Whiptail)




(ଙ) ଫୁଲ ନଫୁଟିବା (Blindness)



(ଚ) ଛୋଟ ଫୁଲ (Buttoning)




(ଟ) ଖୋଲା ଫୁଲ ଫୁଟିବା (Loosening)



ଗାଜର



(କ) ଗାଜର ଫାଟିବା (Cracking)



(ଖ) ଗାଜରରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଦାଗ (Cavity spot)



(ଗ) ଦ୍ୱିଶାଖା ସମସ୍ୟା (Forking)



ଗାଜର ଓ ମୂଳାରେ ଦ୍ୱିଶାଖା ସମସ୍ୟା (Forking in Carrot and Radish)