

ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପିଆଜ ଗୁଷ୍ଟ

ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୪ ହେକ୍ଟର ନିମ୍ନେ ପିଆଜ ଗୁଷ୍ଟ କରାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ପିଆଜ ଏକ ଗଣି ଗଛ କାଳ୍ପନ ଯଥା । ବାସ୍ତବ୍ୟ ଧରି ଗୁଷ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏହି ଫସଲକୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ଗୁଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ ଋତୁ ବା ଅବିନିଆ ଗୁଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ । ଗର୍ଭମାନ ସମୟରେ ଖରିଫ ବା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପିଆଜ ଗୁଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଖରିଫରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଅମଳ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଶେଷ ଭାଗମାନେ ନିମ୍ନ ଲିଷ୍ଟର ପକ୍ଷର ଅନୁସରଣ କଲେ ବର୍ଷାଦିନିଆ ପିଆଜ ଗୁଷ୍ଟ ଆଗାମୀରୁପ ଅମଳ ପାଇବା ସହିତ ବଜାରରେ ଅଧିକ ଗୁଣ୍ଠିତା ଥିବାରୁ ଲାଭାନ୍ୱୟ ହୋଇ ପାରିବେ ।

ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପିଆଜ ଗୁଷ୍ଟର ନମ୍ ଅମଳ ହେବାର କାରଣ :

- ୧) ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣ କିସମ ଗୁଷ୍ଟ ।
- ୨) ବିଳମ୍ବରେ ଗୁରା ପକାଇବା ବଳି ରୋପଣ ।
- ୩) ଖରିଫ ଋତୁରେ ପିଆଜ ପକାଇବା ଓ ଗୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।
- ୪) ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇ ଅଧିକ ଗୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।
- ୫) ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଥିବା ଋତୁରେ ପିଆଜର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଅଧିକ ଥାଏ ।
- ୬) ଏହି ଋତୁରେ ମାଟିରୁ ଘଣ୍ଟି ଆସିବା ଭଲ ଭାବେ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ତେର ଝରା, ମୂଳ ଝରା ଶେଷ ପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ମୂର୍ତ୍ତିକା ଜନିତ ରୋଗ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖୋପାଏ ।
- ୭) ନିୟମିତ ଶୁଣ୍ଠିଗତ ଅଭିଜ୍ଞ କାରଣରୁ ସଞ୍ଚନ କରାଯାଉଥିବା ଫିଙ୍ଗ ନାଶକର ଖଣ୍ଡିକାନ୍ତ କମିଯାଏ ।

- ୧) ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପାସ ସମୟ ଅଧିକ ହେଇଥାଏ ।
- ୨) ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ସାର ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧିପାତ ହେତୁ ଯୋଗ ହେଇଥାଏ ।
- ୩) ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଖାଇବା, ସାଇତି ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ।
- ୪) ଅମଳ ହେବା ପରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପାଇ ପିଆଜ ଗଜା ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ।

ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ

ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଋଷରେ ଜମିରେ ପାଣି ଜମିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ତେଣୁ ଛଷଡ଼ ଢାଲୁ ଜମି ଓ ନିରିତା ମାଟି ବାଛିବା ଦରକାର । ବର୍ଷା ଦିନରେ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ । ତେଣୁ ଋଷ କରିବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ଓ ବିଶୋଧିତ ହେବା ଦରକାର । ଋଷ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସମାନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଏ ।

ମାଟି:

ନିରିତା ହାଲୁକା ବାଲିଆ ଦୋରସା ବା ଦୋରସା ମାଟି ବର୍ଷାଦିନିଆ ଋଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ । ମାଟି ଭଲ ଭାବେ ଋଷ ହୋଇ ଗୁଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର । ବର୍ଷାଦିନରେ ଜମିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୃତାବକ ନାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

କିସମ ଚୟନ:

ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ ଚୟନ କରିବା ଉଚିତ । ଏହି କିସମ ଗୁଡ଼ିକର ରୋଗ ପୋକ ସହଣୀ ଶକ୍ତି ଥିବା ଉଚିତ । ସାଧାରଣତଃ ଖରିଫ ଋଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ପିଆଜ ହେବା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ଚାପମାଡ଼ା ଓ ଛୋଟ ଦିନ (୧୦ ରୁ ୧୧ ଘଣ୍ଟା) ଦରକାର କରେ । ସେହିପରି କେତେକ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ

ହେଲା - ଭିମା ସୁପର, ଭିମାରେଡ, ଭିମାରାଜ, ଭିମା ଚର୍ଚ୍ଚ ରେଡ, ଆଗ୍ନିପାଉଣ୍ଡ ଡାର୍କ ରେଡ, ଏନ-୫୩ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଷାଦିନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିସମ ମାଟିରେ ଥିବା ଅଧିକ ଜଳାୟୁ ଅଂଶ ସହଣୀ ଶକ୍ତି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି କିସମର ପିଆଜର ବେଳ ସବୁ ଥିବା ଦରକାର କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣର ମାଧ୍ୟମ ହେଇଥାଏ ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳବାୟୁ:

ଖରିଫ ପିଆଜ ଋଷ ପାଇଁ ୧୨ ରୁ ୧୮° ସେ. ରାତ୍ରି ଚାପମାଡ଼ା ଓ ୨୫ ରୁ ୩୦° ସେ. ଦିନ ଚାପମାଡ଼ା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ସମୟରେ ୩୦ ରୁ ୪୦ ସେ.ମି. ବୃଦ୍ଧିପାତ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ ।

ଋଷ ପ୍ରଣାଳୀ:

ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପିଆଜ ଋଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ୬.୫ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଓ ୬ ରୁ ୮ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶଯ୍ୟା ତିଆରି କରାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ଶଯ୍ୟାରୁ ଅନ୍ୟ ଶଯ୍ୟା ଭିତରେ ଦୂରତା ୧ ଫୁଟ ରଖାଯାଏ । ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ । ଦରକାର ମୃତାବକ ଶଯ୍ୟା ଲମ୍ବ ରଖାଯାଏ । ମଞ୍ଚି ପରିମାଣ : ଏକର ପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଚି ବୁଣିବା ସମୟ : ଜୁନରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ।

ତଳିଯେବା ପରିଷ୍କଳନା:

ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଏକର ପିଆଜ ଋଷ ପାଇଁ ୪୦୦ ବର୍ଗ ମିଟର ତଳି ଘେରା ଦରକାର ହୁଏ । ମଞ୍ଚି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ପିଛା ୨ ଗ୍ରାମ ଭିଟାଭାକୁ ପାଣ୍ଡାର ଫିମ୍ପି ନାଶକରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜରି ଗୁହ ବା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉଥିବା ପ୍ୟାଷ୍ଟିକ୍ ସୁତଙ୍ଗରେ ଗରା ପକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ୨ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା, ୬ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ମୃତାବକ ଲମ୍ବର ପଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟର ପିଛା ୫ କି. ଗ୍ରା. ସତା ଗୋବର ଖଡ, ୫ ରୁ ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁପ୍‌ଲୀ ସାର ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ନିମ୍ନ ପିଡିଆ ଓ ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ଜିଆଖଟ ଚିହନ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପିଆଜ ଋଷ

ବୃତ୍ତିର ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଆଯାଏ ଓ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ । ପ୍ରତି ଚଳି ଶଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ୬ ଇଞ୍ଚ ଦୂରତା ରଖାଯାଏ । ଚଳି ପକାଇବା ସ୍ଥାନରେ ବରିଷ୍ଠ ମାଟି ନଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ବାଲି ବରିଷ୍ଠ ମାଟି ଓ ଖତ (୧:୧:୧) ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇ ଚଳି ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଯଥେଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡୁଥିବା ଖୋଲା, ପାଣିନିତା ସ୍ଥାନରେ ଚଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଚଳି ଶଯ୍ୟାରେ ୨ ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଧାତିରେ ଚିହନ ବୁଣିବୁ । ଚିହନ ବୁଣିବା ପରେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ନଡ଼ା ଟିକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଝରା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ଗଜା ହେବା ମାତ୍ରେ ଶଯ୍ୟାରୁ ନଡ଼ା ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଚଳିଘରା କଟା ରୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ ରିଡୋମିଲ ଓ ୧ ଗ୍ରାମ ପ୍ଲାନଟୋମାକ୍ସିଡିନ୍ ମିଶାଇ ଚଳି ଶଯ୍ୟାକୁ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ମୃତ୍ତିକା ଜନିତ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଚଳି ଉପାତିବାର ୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଳ ସେଚନ ବନ୍ଦ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଜମିରେ ରୋପଣ ପରେ ଏହା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ବଞ୍ଚିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।

ଚଳି ଘେରରେ ପତ୍ରପୋତା ବା ଅଗମରା ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଓ ବୋରନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଚଳି ୪୫ ରୁ ୫୫ ଦିନର ହେଲେ ଚଳି ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ।

ଲଗାଇବା ସମୟ :

ପିଆଜ ଗରାରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଆଜ ଅକାର (ଗୁଲି) ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲେ ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ଲଗାଇବା ଗରା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ । ଖରିଫ ଋତୁ ଋଷପାଇଁ ଜୁଲାଇରୁ ଅଗଷ୍ଟ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଲଗାଇବା ସମୟ । ବିଳମ୍ବିତ ଖରିଫ ଋଷରେ ଅଗଷ୍ଟରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଚଳି ରୋପଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଲଗାଇବା ପନ୍ଥା :

ବର୍ଷା ଦିନରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଥିଲେ ରୋପଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଜମିରେ ଲଗାଇବାର ୨ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଳ ସେଚନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଲଗାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ

ସେଚନ କରାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଜମିରେ ଜଳ ସେଚନ କରିବା ପରେ ଓହା ମାଟିରେ ଗରା ରୋପଣ କରାଯାଏ ।

ଲଗାଇବା ଦୂରତା :

ଧାତିକୁ ଧାତି ୬ ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଓ ଧାତି ମଧ୍ୟରେ ଗରାରୁ ଗରା ୪ ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ।

ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚ୍ଛଳନା :

ଏକର ପିଛା ୮୦ ରୁ ୧୦୦ କ୍ୟୁଷାଲ ସତ୍ତା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ରାସାୟନିକ ସାର ହିସାବରେ ଏକର ପିଛା ୬୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ୍, ୩୨ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସିୟମ୍ ଓ ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ସଲଫର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଅନୁମୋଦିତ ସମସ୍ତ ସାର ଓ ୫୦ ଭାଗ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ମୂଳି ସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଲଗାଇବାର ୩୦ ଦିନ ପରେ ୨୫ ଭାଗ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ଓ ୪୫ ଦିନ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୫ ଭାଗ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀରେ ଏକର ପିଛା କେଉଁ ସାର କେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ ଲେଖାଗଲା ।

ସାର ଦେବା ସମୟ	ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିଆ	ସୁପର	ପଟାସ	ଗୋବର ଖତ
ରୋପଣ ପୂର୍ବରୁ	୬୦ କି.ଗ୍ରା.	୧୨୦ କି.ଗ୍ରା.	୫୦ କି.ଗ୍ରା.	୮୦ ରୁ ୧୦୦ କ୍ୟୁଷାଲ
ରୋପଣର ୩୦ ଦିନ ପରେ	୩୦ କି.ଗ୍ରା.			
ରୋପଣର ୪୫ ଦିନ ପରେ	୩୦ କି.ଗ୍ରା.			
ମୋଟ ସାର	୧୨୦ କି.ଗ୍ରା.	୧୨୦ କି.ଗ୍ରା.	୫୦ କି.ଗ୍ରା.	୮୦ ରୁ ୧୦୦ କ୍ୟୁଷାଲ

ସୁପର ଫସଫେଟ୍ରେ ଥିବା ସଲଫର ଫସଲକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ସଲଫର ପୋଷାକ ପିଆଜରେ ରାଗ ବାସ୍ନା ଓ ରକ୍ଷଣ ବା ଗଚ୍ଛିତ ସମୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ । ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସିଞ୍ଚନ ଯୋଗ୍ୟ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ଲିଟର ପ୍ରତି ୨ ମି.ଲି. ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ।

ଅନ୍ତଃ କର୍ଷଣ :

ପିଆଜ ଲଗାଇବାର ୬୦ ରୁ ୭୦ ଦିନ ପରେ ମାଟି ଭିତରେ ପିଆଜ ବୃଦ୍ଧି

ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ କୋଡ଼ା, ଖୋସା, ଘାସ ଗଛା, ସାର ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଲଗାଇବା ୫୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେବା ଉଚିତ୍ । ନଚେତ୍ ଏହା ପିଆଜ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ପିଆଜ ଦୁଇ ଫାଳିଆ ହୋଇଯାଏ ।

ଘାସ ଦମନ :

ରୋପଣର ୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଓଦା ହେବାବେଳେ ଅକ୍ଟିଫ୍ଲୋରୋଫେନ୍ ନାମକ ଘାସମୃତା ଔଷଧ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୫ ମି.ଲି. ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଲଗାଇବାର ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନ ପରେ ଘାସ ବାହାରିଲା ପରେ ପ୍ରତି ଲି. ପାଣିରେ ୦.୫ ମି.ଲି. ଅକ୍ଟିଫ୍ଲୋରୋଫେନ୍ ଓ ୨ ମି.ଲି. କୁଇଜିଲପପ୍ ଇଥାଇଲ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଜଳସେଚନ :

ପିଆଜ ଚେର ଅତି ବେଶରେ ୩ ରୁ ୪ ଇଞ୍ଚ ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ । ତେଣୁ ଅଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଥର ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ମାଟିରେ ପିଆଜ ବୁଦ୍ଧି ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ଜଳ ସେଚନ ପାଇଁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ନଚେତ୍ ଅମଳ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ସମୟରେ ଜଳସେଚନ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସାଧାରଣତଃ ଅମଳର ୧୫ ବନି ପୂର୍ବରୁ ଜଳସେଚନ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ନଚେତ୍ ଅମଳ ପରେ ପିଆଜର ସାଇତି ରଖିବା ସମୟ କମିଯାଏ ।

ରୋଗ ନିରାକରଣ :

ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ମୂଳ ସତ୍ତା, ବେକ ସତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଦେଖାଦିଏ । ଏଥିପାଇଁ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚଳିତ ଚେରକୁ ବାଜିଷ୍ଟିନ ହ୍ରାସ (୧ ଗ୍ରାମ/ଲି) ରେ ବିଶୋଧନ କରି ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ । ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଲେ ଡାଇଥେନ୍-ଏମ୍-୪୫ (୩ଗ୍ରାମ / ଲି) ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଯୋଜନା ନିରାକରଣ :

ଉତ୍କଳୀ ଯୋଜ ଆକ୍ରମଣ ପିଆଜ ଫସଲରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଦିଆଯାଏ ।

ଲଗାଇବାର ୩୦ ଦିନ ପରେ ଇମିଡ଼ାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ (୧ମି.ଲି. ୪ ଲି. ପାଣି) ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଅତଏବ ରୋଗଯୋଜ ନିରାକରଣ ସମନ୍ୱୟ ତିନିଗଣା ସଂଲଗ୍ନ ସାଗଣାରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଅମଳ :

ପିଆଜ ଅମଳର ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଳସେଚନ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ପିଆଜ ପତ୍ର ଶୁଖି ମରେ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ୬୦ ଭାଗ ପତ୍ର ଶୁଖି ଚଳିପଡେ ସେତେବେଳେ ଅମଳ କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷାଦିନିଆ ପିଆଜ ଫସଲ ଶୀତ ଦିନେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ କମ୍ ଚାପମାତ୍ରା ରହୁଥିବାରୁ ଫସଲର ପତ୍ର ତଳେ ନାହିଁ ଓ ପୁଣି ବଢ଼ି ଗଲେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ତଳେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥିବା ପିଆଜଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଏହିପରି ହେଲେ ଫସଲ ଉପରେ ଏକ ଖାଲି ହ୍ରମ୍ ଗଡାଇ ବା ବାଉଁଶ ବାଡେଇ ପତ୍ରକୁ ଜବରଦସ୍ତ ତଳାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପରେ ଅମଳ କରାଯାଏ । ଅମଳ ପରେ ପିଆଜକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳାୟତ୍ତ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ୨ ଦିନ ଜମିରେ ରଖାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏକର ପିଛା ୮୦ ରୁ ୧୦୦ କ୍ୟୁଷାଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ।

ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ :

ଫସଲ ହଳଦିଆ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଅମଳର ୧୫-୨୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଲିକ୍ ହାଇଡ୍ରାଜାଇଟ୍ ୧.୫ ରୁ ୩ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛ ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୋ କଲେ ଅମଳ ପରେ ପିଆଜ ଗଜା ନହୋଇ ବହୁତ ଦିନଯାଏ ରହିଥାଏ । ଅମଳ ସମୟରେ ପିଆଜଠାରୁ ୨.୫ ସେମି ନାଡ଼ ରଖି ବାକି ପତ୍ରକୁ ତେରେଛା କାଟି ଦିଆଯାଏ । ଚେର ଓ ମାଟି ସଫାକରି ପିଆଜକୁ ଶୁଖାଇ ରଖିଲେ ବହୁତ ଦିନଯାଏ ସାଇତି ରଖିହୁଏ । ଅମଳ ପରେ ପାଗ ଭଲ ଥିଲେ ଜମିରେ ବା ଅଳ୍ପ ଛାଇ ଜାଗାରେ ୩-୫ ଦିନ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଏ । ଭଲ ପବନ ବାଜୁଥିବା ସମ୍ବେଷ୍ଟ ଟୋଣରେ ପିଆଜକୁ ଶୁଖାଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଓ ଲଘୁପାଲଟ କଲେ ପିଆଜ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଇଥାଏ । ପିଆଜ ଭଲଭାବରେ ଶୁଖିଥିଲେ ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅମଳ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗ ସବୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ବହୁତ ଦିନ ରହେ । ଭଲଭାବରେ ଶୁଖିଥିବା ପିଆଜରେ ୧ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ୦-୧.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଚାପମାତ୍ରା ଓ ଶତକଡ଼ା ୬୦ ଭାଗ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ରଖିଲେ ପିଆଜ ଗଜା ନହୋଇ ବହୁତ ଦିନ ରହିଥାଏ ।

ରୋଗପୋକ ପରିଚ୍ଛେଦନ

ରୋଗ	ଲକ୍ଷଣ	ପ୍ରତିକାର
ତଳିପତ୍ତ ରୋଗ (Damping off Disease)	ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ତଳି ଘରାଣେ ମାଟିକୁ ଲାଗିଥିବା କାଣ୍ଡର ଉପର ଅଂଶ ପଟି ମାଟିରେ ପଡିଯାଏ।	ଏକ କି. ଗ୍ରା. ବିହନ ପ୍ରତି କାପୋନ କିମ୍ବା ଥୋମାସ ଗ୍ରାମ୍‌ଓ ୫ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାଉଜିଙ୍ଗ ଟମ୍ବି କଲଚରରେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ୍।
ବାଦାମୀ ଦାଗ ରୋଗ (Purple Blotch)	ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ ଏବଂ ପିଆଜକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଂଶରେ ଧଳା ହୋଇ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିବା ଦାଗମାନ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଧଳା ଦାଗର ମଝିରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପତ୍ର ଏବଂ କାଣ୍ଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଂଶକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାଏ।	କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍-୫୦- ଡବ୍ରଲି ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରାମ ହିସ୍‌ବରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫୦- ୩୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ୍।
ଡାଉନି ମିଲ୍ଡିୟୁ (Downy Mildew)	ପିଆଜର କାଣ୍ଡ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ବାଇଗଣି ରଙ୍ଗର ତୁଳାପରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।	ବିଡୋମିଲ୍ ଏସ୍.ଜେ.ଡି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡୋମିଲ୍ ଏମ୍-୪୫କୁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩.୦ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫୦-୩୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ୍।
ପିଆଜର ଉକୁଣିଆ ପୋକ (Onion Thrips)	ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ବକା ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ପତ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସେ ନାହିଁ କି ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବଢେ ନାହିଁ।	ମାଲ୍ୟୁଆନ - ୫୦ ଇସି କିମ୍ବା ଡାଇମେଥୋଏଟ୍ - ୩୦ ଇସି ୧.୦ ଲିଟର ଔଷଧକୁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫୦-୩୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦରକାର।
ଅଷ୍ଟପଦୀ (Mite)	ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ରରେ ହଳଦିଆ ଦାଗ ମାନ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଗଛ ବଢେ ନାହିଁ।	ମିଥାଇଲ ଡେମେଟେନ୍- ୨୫ ଇସି କିମ୍ବା ଡାଇମେଥୋଏଟ୍ - ୩୦ ଇସି ୧.୦ ଲି. ଔଷଧ ସହିତ ୧.୦- ଲିଟର ନିମଜାତୀୟ ବିଷ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫୦-୩୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ସୁଫଳ ମିଳେ।
ପିଆଜ ମାଛି (Onion Fly)	ପିଆଜ ମଝିର ଶୁକ୍ଳ ମାଟିରେ ବହୁଥିବା ପିଆଜକୁ ଖାଇଥାଏ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ପିଆଜ କାଳିକ୍ରମେ କଟକ ଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡିଯାଏ।	କାର୍ବେନ୍‌ଥୋରାନ୍-୩ କି. ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫.୦ କି. ଗ୍ରା. ପିଆଜ ଗରା ଲଗାଇବା ସମୟରେ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଉଚିତ୍।
ପିଆଜର ପତ୍ରକଟା ପୋକ (Onion Cut worm)	ପିଆଜ ଗରାର ମୂଳ ଅଂଶକୁ ରାତିରେ କଟି ଦେଇଥାଏ।	କୋରୋପାଇସିଫସ୍-୨୦ ଇସି ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨.୦ ମି.ଲି. ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ୍।