


ରସୁଣ ର ବିଭିନ୍ନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ:

୧. ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ନାସିକ୍, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରୁ ବିକଶିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ:



1. ଏଗ୍ରାଫାଉଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ (ରସୁଣ ଆକାର ୩.୫ ରୁ ୪.୫ ସେମି, ୨୦ ରୁ ୨୫ କୋଲା, ଓ ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧୩୦ କୁଇଣ୍ଟାଲି)



2. ଏଗ୍ରାଫାଉଣ୍ଡ ପାର୍ବତୀ (ରସୁଣ ଆକାର ୫ ରୁ ୬.୫ ସେମି, ୧୦ ରୁ ୧୬ କୋଲା, ଓ ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧୭୫ ରୁ ୨୨୫ କୁଇଣ୍ଟାଲି ରଙ୍ଗ-ବାଇଗଣି)



3. ଏଗ୍ରାଫାଉଣ୍ଡ ପାର୍ବତୀ-୨ (ରସୁଣ ଆକାର ୫ ରୁ ୬ ସେମି, ୧୦ ରୁ ୧୫ କୋଲା, ଓ ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧୭୫ ରୁ ୨୦୦ କୁଇଣ୍ଟାଲି ରଙ୍ଗ-ଧଳା)



* (ଏଗ୍ରାଫାଉଣ୍ଡ ପାର୍ବତୀ-୨ ଉତ୍କଳ ପାର୍ବତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଓ ଉତ୍ପାଦିତ ଉପଯୁକ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ)

4. ଯମୁନା ସଫେଦ-୧ (ରସୁଣ ଆକାର ୪ ରୁ ୫.୫ ସେମି, ୨୫ ରୁ ୩୦ କୋଲା, ଓ ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧୫୦ ରୁ ୧୭୫ କୁଇଣ୍ଟାଲି)

5. ଯମୁନା ସଫେଦ-୨ (ରସୁଣ ଆକାର ୩.୫ ରୁ ୪.୫ ସେମି, ୩୫ ରୁ ୪୦ କୋଲା, ଓ ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ କୁଇଣ୍ଟାଲି)

6. ଯମୁନା ସଫେଦ-୩ (ରସୁଣ ଆକାର ୪.୫ ରୁ ୬ ସେମି, ୧୫ ରୁ ୧୬ କୋଲା, ଓ ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧୭୫ ରୁ ୨୦୦ କୁଇଣ୍ଟାଲି)

7. ଯମୁନା ସଫେଦ-୪ (ରସୁଣ ଆକାର ୩.୫ ରୁ ୪.୫ ସେମି, ୨୦ ରୁ ୨୫ କୋଲା, ଓ ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧୭୫ ରୁ ୨୦୦ କୁଇଣ୍ଟାଲି)



8. ଯମୁନା ସଫେଦ-୫ (ରସୁଣ ଆକାର ୪.୫ ରୁ ୫.୫ ସେମି, ୨୨ ରୁ ୩୦ କୋଲା, ଓ ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧୫୦ ରୁ ୧୭୦ କୁଇଣ୍ଟାଲି)

9. ଯମୁନା ସଫେଦ-୬ (ରସୁଣ ଆକାର ୪.୫ ରୁ ୫.୫ ସେମି, ୨୭ ରୁ ୩୦ କୋଲା, ଓ ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧୮୦ ରୁ ୧୫୦ କୁଇଣ୍ଟାଲି)


10. ଯମୁନା ସଫେଦ-୭ (ରସୁଣ ଆକାର ୪.୫ ରୁ ୫.୫ ସେମି, ୩୦ ରୁ ୩୫ କୋଲା, ଓ ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୨୦୦ ରୁ ୨୨୫ କୁଇଣ୍ଟାଲି)

11. ଯମୁନା ସଫେଦ-୮ (ରସୁଣ ଆକାର ୪.୫ ରୁ ୫.୫ ସେମି, ୧୫ ରୁ ୧୬ କୋଲା, ଓ ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧୭୫ ରୁ ୨୦୦ କୁଇଣ୍ଟାଲି)

12. ଯମୁନା ସଫେଦ-୯ (ରସୁଣ ଆକାର ୪.୮ ରୁ ୫.୫ ସେମି, ୨୨ ରୁ ୩୦ କୋଲା, ଓ ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୨୦୦ ରୁ ୨୨୫ କୁଇଣ୍ଟାଲି)

“ଆଲିୟମ୍” ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ବହୁ ପୁରାତନ କାଳ ରୁ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର “ଏକବୀକ ପତ୍ର” ପୁଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ର ବଂଶଜ । ଏବଂ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଶାଲିଆଡ଼, ସାଲାଡ଼, ଲିକ୍‌ୱେଡ଼ ଟିଭି ସ (scallion), shallot, leek, and chives) ପରିପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରକାରେ ଏହି ବଂଶର ବଂଶଜ ବା ଏହି ପରିବାର ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଆଲିୟମ୍ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି ହେଉଛି ପିଆଜ ଏବଂ ପିଆଜ କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ହିତାୟ ଟି ହେଉଛି ରସୁଣ । ରସୁଣ ଏକ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ମସଲା ଜାତୀୟ ପରିବା, ଯାହା ଆମିଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ରାଧିକ ପରିମାଣ ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଆମିଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ର ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କିନ୍ତୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ରେ ରସୁଣ, ପିଆଜ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ସମ୍ପଦ, କାରଣ ରସୁଣ ରେ ଏକ ପ୍ରକାର ର ରଙ୍ଗହିନ, ଗନ୍ଧହୀନ ପାଣିରେ ଦ୍ରବିତ ହେଲା ପରି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ “ଆଲିୟମ୍” ବୋଲି କହିଥାଉ ।

ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରସୁଣ କୁ ଦାନ୍ତ ରେ ଚୋବାଇଥାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣ ରୁ ରସୁଣ କୋଲା ରେ ଥିବା ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ “ଆଲିୟମ୍” ନାମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏହି “ଆଲିୟମ୍” ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି “ଆଲିୟମ୍” ନାମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହି “ଆଲିୟମ୍” ଏକ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧକ ଯୁକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରସାୟନିକ ଭାଷାରେ “ଡାଇ ଆଲାଇଲ୍ ଥାୟୋ ସଲ୍‌ଫିନେଟ୍” ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏହି “ଆଲିୟମ୍” ହିଁ ରସୁଣ ର ଏକମାତ୍ର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ରସୁଣ ରେ ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବାରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି “ଆଲିୟମ୍” ଆମ ଶରୀର ରେ ଥିବା ଚକ୍ର କର୍ତ୍ତା ରେ (cholesterol) ବା ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ କୁ କମ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ କର୍କଟ ବା (cancer) ଭଳି ରୋଗ ର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କୁ ବଢ଼ାଇ ଥାଏ ।



ରସୁଣ ଆମ ଶରୀର ରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ବା (Blood sugar) କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ରସୁଣ ବଦହଜମି ଓ ବାତ ପ୍ରଭୃତି ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ଯଦି ଆମେ ରସୁଣ ର ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ହେଲେ ଅନ୍ୟ “ଆଲିୟମ୍” ତୁଳନା ରେ, ରସୁଣ ମାତ୍ରାଧିକ ପରିମାଣ ରେ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଯୁକ୍ତ । ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ରସୁଣ ରେ,

୨୯ ଗ୍ରାମ-ଶ୍ୱେତସାର (Carbohydrates),

୬.୩ ଗ୍ରାମ-ପ୍ରୋଟିନ (Protein) ଏବଂ

୩୦ ମିଲିଗ୍ରାମ-କାଲ୍‌ସିୟମ (Calcium) ଥାଏ ।

ରସୁଣ ରେ ଜିନାମିନ୍ ‘ସି’ ବା ଜୀବସାର ‘ଗ’ ମାତ୍ରାଧିକ ପରିମାଣ ରେ ଥାଏ ।

୨. ଭାରତୀୟ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ଗବେଷଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ପୁଣେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବିକଶିତ କିସମ:



1. ଭୀମା ପର୍ଯ୍ୟାଳ (୧୨୦ ରୁ ୧୩୫ ଦିନରେ ଅମଳକ୍ଷମ, ହେକ୍ଟେର ପ୍ରତି ୫୫ ରୁ ୬୫ କୁଇଣ୍ଟାଲ)
2. ଭୀମା ଓମକାର (୧୨୦ ରୁ ୧୩୫ ଦିନରେ ଅମଳକ୍ଷମ, ହେକ୍ଟେର ପ୍ରତି ୭୦ ରୁ ୧୨୫ କୁଇଣ୍ଟାଲ)



୩. ମହାତ୍ମା ପୁଲେ କୃଷି ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ରାହୁରି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରୁ ବିକଶିତ କିସମ:
 1. ଗୋଦାବରୀ (ରଙ୍ଗ-ବାଇଗଣି) 2. ଶ୍ୱେତା 3. ପୁଲେ ବାସବନ୍ତ 4. ପୁଲେ ନାଳିମା
୪. ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂହ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ହିସାର, ହରିୟଣାରୁ ବିକଶିତ କିସମ:
 1. ଏଚ ଜି-୧ 2. ଏଚ ଜି-୨

୫. କୁମାରଗଡ଼ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କୁମାରଗଡ଼, ଗୁଜୁରାଟରୁ ବିକଶିତ କିସମ:

1. ଜି ସି-୨ 2. ଜି ସି-୩ 3. ଜି ସି-୪

୬. ପଞ୍ଜାବ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଲୁଧିଆନା, ପଞ୍ଜାବରୁ ବିକଶିତ କିସମ:

1. ଏଲ ସି-୧ 2. ୭-୫୬-୪

୭. ବିବେକନ ପାର୍ବତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା (ଭା. କୃ. ଅ. ଦୁ. ପ), ଆଲମୋରାରୁ ବିକଶିତ କିସମ:

1. ଜି ଏଲ-୬ 2. ଜି ଏଲ-୭ 3. ଜି ଏଲ ରସୁଣ-୧

ରସୁଣ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳବାୟୁ:

ପ୍ରଥମତଃ ରସୁଣ ହେଉଛି ଏକ ଶୀତ ଦିନିଆଫସଲ ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶାଖା ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁଷାର ପାତ କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ। ରସୁଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଶାଖାବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ଶୀତ ଋତୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥିବା ବେଳେ ତାର ପରିପକ୍ୱ ସମୟରେ ଏହା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଶୁଷ୍କ ଋତୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ । ଉଭୟ ବିଶାଳେଇ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ରସୁଣ ର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି । କମ୍ପାପମାତ୍ରା ରସୁଣ ର ଆକାର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ରସୁଣ ର ଶାଖା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ରସୁଣ ର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ୨୫ ରୁ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଭାରତରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ରସୁଣ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦିବାଲୋକବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହି କିସମ ର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହାରାହାରି ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଦିବାଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ରସୁଣ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ତିକା:

ରସୁଣ ଚାଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ଓ କାଦୁଆ ମାଟି ଉପଯୁକ୍ତ । କିନ୍ତୁ ମାଟି ନିଗିତା ଓ ଜୀବାସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର । ମାତ୍ରାତ୍ମକ ଅମ୍ଳିୟ ଓ କ୍ଷାରିୟ ମାଟି ରସୁଣ ଚାଷ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ ।

ରସୁଣ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ କଣ ବା କେଉଁ ମାସରେ ରସୁଣ ଲଗାଇବା ଦରକାର?

ରସୁଣ ଚାଷ ସାଧାରଣତଃ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଓ ଗୁଜୁରାଟ ପରି ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ରସୁଣ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କରାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରସୁଣ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ।

ରସୁଣ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିହନ ପରିମାଣ

ରସୁଣକୋଳା ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ବିହନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ୮ ରୁ ୧୦ ମିଲିମିଟର ଗୋଲେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ରସୁଣ କୋଳା ହିଁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିହନ । ତେବେ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ରସୁଣ ଚାଷ ପାଇଁ ହାରାହାରି ୫୦୦ ରସୁଣ କୋଳା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।


ରସୁଣ ଚାଷ ପାଇଁ ଗଛ କୁ ଗଛ ଓ ଧାତି କୁ ଧାତି ବ୍ୟବଧାନ:

ରସୁଣକୋଳା ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ଧାତି କୁ ଧାତି ୧୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଗଛ କୁ ଗଛ ୧୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଯଦି ରସୁଣକୋଳା ଛୋଟ ହୋଇଥିବ ଧାତି କୁ ଧାତି ୧୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଗଛ କୁ ଗଛ ୮ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ଦରକାର ।



ରସୁଣ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ରସୁଣ ଚାଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଜମିକୁ ୪ ରୁ ୫ ଥର ଗୁଣ୍ଠ ଚାଷ କରନ୍ତୁ । ମାଟିରେ ରସୁଣ ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ୮ ରୁ ୧୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏଣୁ ଗଭୀର ଚାଷ ର ଆବଶ୍ୟକତା ସେତେ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ମାଟି ରୁ ପୂର୍ବ ଫସଲ ର ଅନାବଶ୍ୟକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବାଛିନେବା ଦରକାର ।



ରସୁଣ କିପରି ଲଗାଇବା ଦରକାର ?

ରସୁଣ ସାଧାରଣତଃ ୪ ଟି ପଦ୍ଧତିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ।

୧-ଡିବ୍ଲିଙ୍ଗ୍ (Dibbling) : ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରଥମେ ଜମିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଆରିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ରସୁଣ କୋଲା କୁ ୫ ରୁ ୭.୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରତାରେ, ତାର ମୁନିଆ ଅଗ୍ରଭାଗ କୁ ଉପରକୁ କରି ଲଗାଯାଇଥାଏ ।

୨-ନାଳୀରେ ଲଗାଇବା (Furrow Planting) : ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ରସୁଣ କୋଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଗଭୀର ନାଳୀରେ ରୋପଣ କରି ହାଲୁକା ମାଟି ଦ୍ଵାରା ଘୋଡେଇ ଦିଆଯାଏ ।

୩- ଛଟା ବୁଣା (Broadcasting) : ଏହି ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣତଃ ଗୁଜୁରାଟ୍ର ଦେଶା ଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ରସୁଣ କୋଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ସମତଳ ଯୁକ୍ତ ଜମିରେ ବୁଣିଦିଆଯାଏ । ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଇ ମଞ୍ଜାୟାଏ । ଯାହାଦ୍ଵାରା ରସୁଣ କୋଲା ସବୁ ମାଟି ଭିତରେ ରହି ଗଜା ହୋଇଯାଏ ଓ ପରେ ପରେ ଗଛ ହୋଇ ବଢ଼ିଥାଏ ।

୪- ରସୁଣ ଚାଲା ରୋପଣ (Bulbil planting) : ଏହି ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣତଃ ହିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ରସୁଣ ଚାଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚାଲା ଗୁଡ଼ିକ ୪୫ ଦିନର ହେଲେ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଏ ।

ରସୁଣ ଚାଷରେ ଖତ ସାର ପରିଚାଳନା:

ରସୁଣ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିରେ ୧୫ ରୁ ୨୦ ଟନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାରୀ । ଅନୁମୋଦିତ ସାରା ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦୦: ୫୦: ୫୦: ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଜନ, ଫସ୍ ଫରସ, ପୋଟାସ ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ୫୦ ପ୍ରତିଶତ



ଯବକ୍ଷାରଜନ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଫସ୍ ଫରସ, ପୋଟାସ ଓ ଗନ୍ଧକ କୁ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ରସୁଣ କୋଲା ଲଗାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଯବକ୍ଷାରଜନରସୁଣ କୋଲା ଲଗାଇବା ୧ ମାସ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାରୀ । ତେବେ ମାତ୍ରାତ୍ମକ ଯବକ୍ଷାରଜନ ରସୁଣରେ ମୋଟା ବେକ ଓ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଗଜା ହେବା ପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ମାଟିରେ ଗନ୍ଧକର ମାତ୍ରା କମ୍ ଥିଲେ ସେଥିରେ ୪୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଅଧିକ ଥିଲେ ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଗନ୍ଧକପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାରୀ ।

ରସୁଣ ଚାଷରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା:

ରସୁଣ ଚାଷରେ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଵଳ୍ପ ଲମ୍ବା ଦିନିକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଜମ୍ବୁ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ । ତେବେ ରସୁଣ ଚାଷ ଶାଖା ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ୭ ରୁ ୮ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରସୁଣ ଚାଷ ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଟି ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ରାତ୍ମକ ଅମଳ ପାଇଁ ଫସଲ ଟି ଉପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉ ମାଟିର ଆବୃତ୍ତ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାରୀ । ତଥା ଜଳସେଚନ ରସୁଣ ଚାଷରେ ରୋଗ ପୋକ ଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଫସଲ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭ ଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ରସୁଣ ଚାଷରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଘାସ ପରିଚାଳନା:

ଅନାବଶ୍ୟକ ଘାସ ଥିବା ଜମିରେ ରସୁଣ ଚାଷ ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣତଃ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନଥାଏ । ସୁତରାଂ ରସୁଣ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜମିକୁ ଘାସ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାରୀ । ଲମ୍ବ ଅବଧିର ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ରସୁଣ ଚାଷରେ ୨ ଥର ଘାସ ବାଛିବା ଦରକାରୀ । ପ୍ରଥମ ଟି କୋଲା ଲଗାଇବାର ୧ ମାସ ପରେ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ଟି କୋଲା ଲଗାଇବାର ୨ ମାସ ପରେ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପେଣ୍ଡିମିଆଲିନ୍ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୩.୫ ଲିଟର ହିସାବରେ କୋଲା ଲଗାଇବା ପରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଜଳସେଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ସହିତ ୪୫ ଦିନ ପରେ ଘାସ ବାଛି ନେବା ଦରକାରୀ ।

ରସୁଣ ଅମଳ କିପରି କରିବା ?

ସାଧାରଣତଃ ରସୁଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ରୁ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ହୋଇ ଶୁଷ୍କ ଝଟି ଗଲେ ଆମେ ଜାଣି ପାରୁ ଯେ ଏହା ପରିପକ୍ୱ ବା ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲା । ଏହି ପରିପକ୍ୱତା ସାଧାରଣତଃ କୋଲା ଲଗାଇବା ୪ ରୁ ୫ ମାସ ପରେ ଆସିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ପରିପକ୍ୱତା ରସୁଣ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଜାଗାର ଜଳବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ପରିପକ୍ୱତା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରସୁଣ ଅମଳ କଲେ ଏହା ନିମ୍ନ ମାନର ହୋଇ କମ୍ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ।

ରସୁଣ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ:

ରସୁଣ ସାଧାରଣତଃ ତାର ଗଛକୁ ଧରି ଉପରକୁ ଭିଡି ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରେ ପରେ ପାଖାପାଖି ୧ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଖାଇବା ର ମୂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ବଜାୟ ରଖିବା । ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଖିବା ବାଟା ସେଥିରେ ରୋଗ ପୋକ ର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ରସୁଣ ସବୁ ସମୟରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଜାଲ ଜାଗାରେ ଖେଳେଇ କରି ସାଇତି ରଖିଲେ ଏହା ୬ ରୁ ୮ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖା ଯାଇ ପାରିବ । ତେବେ ରସୁଣ କୁ ତାର ଗଛ ସହିତ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି ରସୁଣ କୁ ଗାମା ରାତି ଏସବୁ ଦେଇ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଗଜା ନହୋଇ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରେ । ରସୁଣ ର ଅମଳ ସାଧାରଣତଃ କିସମ ଓ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ତେବେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୦୦ ରୁ ୨୦୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ ରସୁଣ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ ।

