

ବ୍ୟବସାୟଭିତ୍ତିକ ଛତୁଚାଷ

ଆଲୋଚ୍ୟା:

ଶ୍ରୀମତୀ ସନ୍ଧିତା ପାଲ, ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଗୃହ ବିଜ୍ଞାନ)
ଡ. ମୟୂରୀ ସିଂ ସରଦାର, ବୈଜ୍ଞାନିକ (କୃଷି ସଂପ୍ରଦାରଣ)

ସଂପାଦନା:

ଶ୍ରୀ ତପନ କୁମାର ଦାସ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ବୌଦ୍ଧ

ପ୍ରକାଶକ:

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ବୌଦ୍ଧ

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ : ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୩

ମୁଦ୍ରଣ:

ଅଙ୍କିତା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଫୋନ୍ ୯୪୩୭୦୭୭୩୩୭

BYABASAYABHITTIKA CHATUCHASHA

By

Mrs. Sasmita Pal, Scientist (Home Science)

Dr. Mayuri Singh Sardar, Scientist (Agril. Extn.)

Editor

Mr. Tapan Kumar Das

Sr. Scientist and Head

Krishi Vigyan Kendra, Boudh

Published by

Krishi Vigyan Kendra, Boudh

First Edition : December, 2023

Printed by

Ankita Graphics, Bhubaneswar.

Cell : 9437077337 / saroj77337@gmail.com



ବ୍ୟବସାୟଭିତ୍ତିକ ଛତୁଚାଷ

ଛତୁଚାଷର ଆବଶ୍ୟକତା

ସ୍ୱାଦ : ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ଗୁଡ଼ିକର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଛତୁର ଆଦର ରହି ଆସିଛି । ଚମକାର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭାଗର ଭୋଜିଭାତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ଛତୁ ତିଆରି ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଆଦର ଅଧିକ । ନିରାମିଷ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଛତୁ । ଛତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଛତୁ ପକୋଡ଼ା, ଛତୁ ଚାଉଁଳ, ଛତୁ ବେସର, ପତ୍ରପୋଡ଼ା, ସୁପ୍, ଶସ୍, ଆମେନ୍, ଛତୁ ପିଜା, ଚିଲି ମସରୁମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦୃତ । ଛତୁରୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଗୁଡ଼ିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିମ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲାଣି ।

ଖାଦ୍ୟରେ ଛତୁର ଆବଶ୍ୟକତା : ଛତୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ । ଏହା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ପରିଶ୍ରମରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବାରୁ ଜାତିସଂଘର ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂସ୍ଥା ଶ୍ରେତସାର ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଭାରତ ପରି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଛତୁର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁପାରିସ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟର ବିକଳ । ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଏହା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ଛତୁକୁ ଗରିବର ମାଂସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ତତକା ଛତୁରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଗ୍ରାମ୍

ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଷ୍ଠିସାର ଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଛତୁରେ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଧାତବ ଲବଣ, ଜୀବସାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ଗୁଣ ରହିଛି।

ଛତୁର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ : ଚମକ୍କାର ଖାଦ୍ୟଗୁଣ ସହିତ ଛତୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର। ହୃଦ୍‌ରୋଗୀ, ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗୀ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗୀ, ଅମ୍ଳରୋଗୀ, ସ୍ତୁଳକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ। ଧୂଳିରା ଛତୁରେ କର୍କଟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ରହିଛି।

ଛତୁଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ : ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ, ପରିପରିବା ଚାଷ, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଦୁର୍ଲ୍ଲଭରେ ଛତୁ ଚାଷରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଓ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ପାଳ ଛତୁ ବେତ ବା ଭାଡ଼ି ପାଇଁ ୬୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେଥିରୁ ୧୫ରୁ ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ଛତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ବଜାରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧୨୦ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ ୬୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଧୂଳିରା ଛତୁରେ ବ୍ୟାଗ ପ୍ରତି ୨୫ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବ୍ୟାଗ ପ୍ରତି ୧.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଛତୁ ଆଦାୟ କରି ତାକୁ ବଜାରରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୫୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ ସମୁଦାୟ ୨୫ ଟଙ୍କା ମିଳେ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦ ଯାଇ ୫୦ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ।

ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଗାର ଆବଶ୍ୟକତା : ଗୋଟିଏ ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ ଧାନ ପରି ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ ହାରାହାରି ୩୦ରୁ ୬୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ହୋଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ଚାହାର ମୂଲ୍ୟ ବାବଦରେ ଚାଷୀ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ହାରାହାରି ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ୩୦,୦୦୦ ରୁ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ସେହି ପରିମାଣ ଜମିରୁ ୨୦,୦୦୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତୁ ଅମଳ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାକୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ହାରାହାରି ୫୦ ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରୟ କରି ସମୁଦାୟ ୧୦,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆୟ କରାଯାଇପାରେ।

କମ୍ ନିୟୁକ୍ତି : ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ଛତୁଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଛତୁଚାଷ ଦ୍ଵାରା ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ, ବିହନ ଯୋଗାଣ, ଛତୁ ବିକ୍ରୟ, ଛତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ରହିଛି।

ସରଳ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି : ଛତୁର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜଟିଳ

ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ ଚାଲିମ ନେଇ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ।

ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁ ଚାଷ : ଛତୁ ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବାରୁ ଗାଁ ଗହଳିର ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଳକା ସମୟକୁ ଛତୁଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ।

କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ, ଜଙ୍ଗଲ ତଥା ଗୃହର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବା ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା : କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀର ଅଧିକତର ବିକାଶ ଫଳରେ କୃଷି ଓ ଆନୁସଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା ଜଙ୍ଗଲ, ଗୃହ ଓ ଆମ ପରିବେଷ୍ଟନାରୁ ନିର୍ଗତ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥର ବିନିଯୋଗ ହୋଇନପାରି ତାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବେଶଗତ ଓ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ସେଲୁଲୋଜ୍, ହେମିସେଲୁଲୋଜ୍ ଓ ଲିଗିନିନ୍ ପରି ପୋଷକ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହିସବୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥର ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଛତୁ ହେଉଛି ଏକ ସରଳ ଓ ସମୟୋପଯୋଗୀ ପ୍ରତିକାର।

ଛତୁ ଫାର୍ମର ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଭଜନକ ଉପଯୋଗ : ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଛତୁଫାର୍ମରୁ ବ୍ୟବହୃତ ନଡ଼ା ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆକାରରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଛତୁ ଚାଷ, ମୃତ୍ତିକା ସୁଧାର, ଜୈବିକ ସାର, ଜୈବିକ ଖତ ଓ ଜିଆଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଉନ୍ନତ ଗୋଷ୍ଠାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସଂକ୍ରମିତ ମାଟି ଓ ଜଳର ଜୈବ ସୁଧାରକ, ରୋଗ ପରିଚାଳନାରେ ଭୂମିକା, ବାୟୋଗ୍ୟାସ ବା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।

ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ : ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଛତୁର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବଜାର ଚାହିଦା ରହିଛି। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ବିଦେଶକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଛତୁ ରପ୍ତାନୀ କରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ କରିହେବ।

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ପାଣିପାଗରେ ସାଧାରଣତଃ ୩ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା : ପାଳ ଛତୁ, ଧୂଳିରା ଛତୁ ଓ ଦୁଧ ଛତୁ। ଖରା ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ଦିନରେ ଧୂଳିରା ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଏ।

ପାଳଛତୁ

ପାଳ ଛତୁ ସରୁଠାରୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ଗୁଡିକର । ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଳଗଦାମାନଙ୍କରେ ଏହି ଛତୁ ଫୁଟୁଥିବାର ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ । ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଛତୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଚୀନ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ତାଇୱାନ, ମାଲେସିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, କୋରିଆ ପ୍ରଭୃତି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଛତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଳ ଛତୁର ସ୍ଥାନ କ୍ଷଣ୍ଡ । ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସମୁଦାୟ ପାଳ ଛତୁର ୭୦ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ଚୀନ ଦେଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।

ପାଳ ଛତୁର ପ୍ରଜାତି ବା ନିସମ

ପାଳ ଛତୁର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଭଲ୍ବିରିଏଲା । ଏହାର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି ପ୍ରଜାତି ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାରତରେ ୧୯ଟି ଖାଦ୍ୟଯୋଗୀ ପ୍ରଜାତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ନିସମ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗାଡ଼ କ୍ଷଣରା ରଙ୍ଗର । ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗ କଳା, ଆକାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ଓ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ଅଧିକ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଭଲକାରିଏଲା ଭଲଭାସି କହନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଭଲଭାରିଏଲା ଦିପ୍ଲୁସି । ଏହା ଧଳା ବା ଜନ୍ଧର ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର, ଆକାର ଛୋଟ ଓ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ।


ପାଳ ଛତୁରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ :

ଖାଦ୍ୟଗୁଣ	୧୦୦ ଗ୍ରାମ ତାଳା ଛତୁରେ ଥିବା ପରିମାଣ	ଖାଦ୍ୟଗୁଣ	୧୦୦ ଗ୍ରାମ ତାଳା ଛତୁରେ ଥିବା ପରିମାଣ
ଜଳୀୟ ଅଂଶ	୯୦.୪ ଗ୍ରାମ	ପୋଟାସିୟମ	୦.୩୨ ଗ୍ରାମ
ଚର୍ବି	୦.୨୫ ଗ୍ରାମ	କ୍ୟାଲସିୟମ	୫.୬ ଗ୍ରାମ
ପୁଷ୍ଟିସାର	୩.୯୦ ଗ୍ରାମ	ଥାୟାମିନ୍	୦.୧୪ ମିଲିଗ୍ରାମ
ସମୁଦାୟ ଚକ୍ର	୧.୮୭ ଗ୍ରାମ	ରାଇବୋଫ୍ଲେବିନ୍	୦.୬୧ ମିଲିଗ୍ରାମ
ଭସ୍କ	୧.୧୦ ଗ୍ରାମ	ନିଆସିନ୍	୨.୪୦ ମିଲିଗ୍ରାମ
ଫସ୍ଫୋରସ୍	୦.୧୦ ଗ୍ରାମ	ଆୟୋଡିନ୍ ଏସିଡ୍	୧୮.୦୦ ମିଲିଗ୍ରାମ

(ସୌଜନ୍ୟ : ଆହାରାଭ୍ୟାସ ଓ ଚିକିତ୍ସା, ୨୦୦୭)

ଛତୁର ଘର ବା ଫାର୍ମ

ବ୍ୟବସାୟିକଭିତ୍ତିରେ ଛତୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଛତୁ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ କାନ୍ଥୁ ବିହୀନ ଚାଳ ଛପର ଘର ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଘର ମଧ୍ୟରେ



ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତା ୧୦ରୁ ୧୨ ଫୁଟ ଓ ଚାରି ପଟର ଉଚ୍ଚତା ୫ରୁ ୬ ଫୁଟ ହେବା ଦରକାର । ଘରଟିର ଚାରିପଟ ଖୋଲା ରହିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପରୋକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଘର ବା କାଗାରେ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ । ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଅବାଧ ପବନ ଚଳାଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର । ସେଥିପାଇଁ ଛତୁ ଘର ଚାରିପଟେ ବାଉଁଶର ଚାଞ୍ଚ ଦେଇ, ଅଥବା କାଳି ଟାଙ୍ଗି କିମ୍ବା ସେଭ୍ କର୍ ଦେଇ ପବନ ଚଳାଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ । ଦୈନିକ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଛତୁ ଫାର୍ମର ଆକାର ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ପାଳ ଛତୁ ଭାଡ଼ି ପାଇଁ ୮ରୁ ୧୦ ବର୍ଗ ଫୁଟ ଜାଗା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଭାଡ଼ିର ପ୍ରକୃତ ଆକାର, ଭାଡ଼ି-ଭାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ, ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ୧୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ ସ୍ଥାନରେ ୧୦ରୁ ୧୨ଟି ପାଳଛତୁ ଭାଡ଼ି ତିଆରି କରିହେବ । ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଥିଲେ ଛତୁ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଥାଳ କରି ସେଥିରେ ଅନେକ ଭାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ପରିଚାଳନାଗତ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘର ଭିତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତିନି ଥାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ । ବଡ଼ ବଡ଼ ଝରକା ଥିବା ଆକବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ଓ କଂକ୍ରିଟ୍ ଛାତଯୁକ୍ତ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ ପାଣିପାଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଚାଳ ଛପର ଘର ଛତୁଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ । ସାମିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଛତୁଘର ନିର୍ମାଣ ନ କରି ଖୋଲାରେ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଛତୁଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡୁନଥିବା ଝାଉଁଶି, ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା, କଦଳୀ ବାଡ଼ି, ଚାଲୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ, ଆମତୋଟା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଓ ପାଣିପବନ ସମୟରେ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଛତୁ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଘର ଭିତରେ ଓ ଘର ବାହାରେ ଛତୁ ଚାଷ କଲେ ପରିଚାଳନାଗତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ।

ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣିପାଗ

ଉତ୍ତାପ : ପାଳ ଛତୁ ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଛତୁ। ତେଣୁ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ୨୫ରୁ ୩୮° ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ୩୦ରୁ ୩୨° ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଛତୁ ଭଲ ଫୁଟେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ବର୍ଷାଋତୁରେ ତାପମାତ୍ରା ଉପଯୁକ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ସେହି ସମୟରେ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଛତୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛତୁ ବେତ୍ ବା ଭାଡ଼ିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ତାପ ହେଉଛି ୩୨° ସେଲସିୟସ୍।

ଆର୍ଦ୍ରତା : ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ୮୦ ରୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରୟୋଜନ। ଆର୍ଦ୍ରତା କମିଗଲେ ଛତୁର ଆକାର ଓ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବାୟୁରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହୁଥିବାରୁ ସେହି ସମୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ୍ ରହେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରଭୃତିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରାୟ କମ୍ ରହେ। ଛତୁ ଘରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଛତୁ ଘର ଚାରିପଟେ ଓଦା ଅଥବା ଚାଙ୍ଗି, ଚଟାଣରେ ବାଲି ପକାଇ ଓ ତାକୁ ଓଦା ରଖି କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟକୁ ପାଣି ସ୍ତ୍ରୋ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ହାଇଡ୍ରୋମିଟ୍ର ନାମକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଦ୍ରତା ମପାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଥିବା ଦୋକାନରୁ ଏହା ସହଜରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇପାରେ। ଛତୁ ଘରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟୁମିଡିଫାଇର ବା ଫଗର୍ ଯନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଏହିସବୁ ଯନ୍ତ୍ରର ସହାୟତା ନନେଇ ମଧ୍ୟ ଛତୁ ଚାଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି।

ଆଲୋକ : ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛତୁ ତୁଳନାରେ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷରେ ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ। ଭଲ ଅମଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ୫୦୦ରୁ ୧୦୦୦ ଲକ୍ଷ ପରିମାଣର ଆଲୋକ ଦରକାର। ଧୂଳିରା ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଏହା ୨୦୦ରୁ ୫୦୦ ଲକ୍ଷ। ଆମେ ରହୁଥିବା ଘରର କବାଟ ଝରକା ଖୋଲି ଦେଲେ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଆଲୋକ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ତାହା ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଧରିବାକୁ ହେବ। ଖୋଲା ଜାଗାରେ, ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଆଲୋକ ମିଳିଥାଏ ଓ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳେ।

ପବନ ଚଳାଚଳ : ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଜାଗାରେ ଫୁଲ୍ଲ ପବନ ଚଳାଚଳ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛତୁ ଭାଡ଼ି ଓ ଘର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ହାନିକାରକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଷ୍କାସନ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଭାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ବିଛାର ଲାଭ କରୁଥିବା ଛତୁ ଫିମ୍ପି ଅଧିକ ଅମୃତଜନ ପାଇଥାଏ। ଉତ୍ତାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ପବନ ଚଳାଚଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଘର ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତଜନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ଚଳାଚଳ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦାନ :

ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଗାକାର ଭାଡ଼ିରେ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ବିଚାରକୁ ନେଇ ୧.୫ ଫୁଟ ଲମ୍ବ, ୧.୫ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଓ ୧.୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଡ଼ି ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଆଜିକାଲି ଲମ୍ବ ନଡ଼ା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ନଡ଼ାର ଲମ୍ବକୁ ଭାଡ଼ିର ଲମ୍ବ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଭାଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ। ପାଣିପାଗ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଭାଡ଼ିର ଆକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକାର ଭାଡ଼ି ପାଇଁ ୭ କି.ଗ୍ରା. ନଡ଼ା (ପ୍ରାୟ ୧୪ ବିଡ଼ା), ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଛତୁ ମଞ୍ଜି (୧ ବୋତଲ) ଓ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଡାଲିଗୁଣ୍ଡ ବା ଗହମ ଚୋକଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।

ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ :

୧. ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଷ୍କଥିବା ଚାଣ ମୋଟା ନଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ଅପେକ୍ଷା ଦେଶୀ ଧାନର ନଡ଼ା ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ।
୨. ନଡ଼ା ବିଡ଼ାରୁ ପତ୍ର ଅଂଶ ଓ ଶିଶା ବାହାର କରିଦେବା ଭଲ। ଭାଡ଼ିର ଲମ୍ବ ଅନୁସାରେ ବିଡ଼ାର ଅଗ ଓ ମୂଳ ସାମାନ୍ୟ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କାଟିବା ବେଳେ ମୂଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଗ କାଟିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଗଣ ନଡ଼ାର ମୂଳ ଭାଗ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ।
୩. ଏହାପରେ ନଡ଼ା ବିଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ୬ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ଭିଜାନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନଡ଼ା ନରମ ହୋଇଯାଏ ଓ ଏଥିରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟଗୁଣ ପାଣିରେ ଦ୍ରବିତ ହୋଇ ଛତୁ ଫିମ୍ପି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଏ।
୪. ତା'ପରେ ନଡ଼ା ବିଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ସେଥିରୁ ବଳକା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାରେ ନ ଶୁଖାଇ ଫୁଲ୍ଲ ପବନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଛାଇ

ଜାଗାରେ ଚାର୍ଯ୍ୟାଳ ଭାବରେ ରଖିଲେ ପାଣି ସହଜରେ ନିଶିଡ଼ିଯାଏ। ଭାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ନଡ଼ାରେ ୫୦ରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ବତର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଭାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ନଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭାଡ଼ିରେ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବା ପ୍ରତିଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵୀ ପିମ୍ପିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ନଡ଼ାରେ ପାଳ ଛତୁର ପିମ୍ପି ଭଳି ଭାବରେ ମାଡ଼ିଥାଏ ଓ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳେ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅପେକ୍ଷା ଗରମ ପାଣି ବା ବାମ୍ଫ ଦ୍ଵାରା ନଡ଼ା ବିଶୋଧନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ତେଣୁ ଗରମ ପାଣି ବା ବାମ୍ଫରେ ନଡ଼ାକୁ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଉପଚାର କରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳିଥାଏ।

ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନଡ଼ାରେ ଜଳାୟ ଅଂଶ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ନିଶିଡ଼ା ପାଇଁ ଗଣ୍ୟଯାଉଥିବା ନଡ଼ା ବିଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବିଡ଼ାକୁ ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଜୋରରେ ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ହାତ ପାପୁଲି ଓଦା ରହେ ମାତ୍ର ବିଡ଼ାରୁ ପାଣି ନିଶିଡ଼େ ନାହିଁ, ତେବେ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବତର ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କାଚ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗି ବା ପଲିଥିନ୍ ପାଉର୍ ଚିରି ମଞ୍ଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ। କାଚ ବୋତଲର ମୁହଁ ପଟ୍ଟେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ହାତୁଡ଼ି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଓଜନିଆ ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ବୋତଲକୁ ଆଘାତ କଲେ ତାହା ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏହାପରେ ମଞ୍ଜିରେ ଲାଗିଥିବା ଚୁକ୍କୁରା କାଚ ଖଣ୍ଡକୁ ବୋତଲରେ ଲାଗିଥିବା ଚୁକ୍କା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ।

ସମୁଦାୟ ମଞ୍ଜିକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚାରି ଭାଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗକୁ ଏକ ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚ ବା ଚୁଡ଼ା ଅଙ୍ଗୁଳି ମୋଟର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗ କରନ୍ତୁ। ତାଲି ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଭାଗ କରନ୍ତୁ।

ମାଟି ବା ଚଟାଣରୁ ପ୍ରାୟ ଫୁଟେ ଉପରେ ବାଉଁଶର ଫ୍ରେମ୍ ବା ଥାକ କରି ତା' ଉପରେ ଛତୁ ଭାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଡ଼ି ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଥାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଛତୁ ଫାମ୍ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତିନିଥାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ।

ଆଗରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଥାକ ଉପରେ ଛତୁ ଭାଡ଼ି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଥାକ ଉପରେ ୫ ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବିଛାନ୍ତୁ ଯେପରି ଭାଡ଼ିର ଲମ୍ବ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ

ରହିବ ଓ ନଡ଼ା ବିଚାର ମୂଳ ପଟ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ରହିବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ତର। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଚୁଡ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋଟେ ମଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ତରର ୩ ରୁ ୪ ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ତାଲି ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ସ୍ତରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମଞ୍ଜି ଓ ତାଲି ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ନଡ଼ାର ମୂଳ ପଟ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଅନ୍ୟ ସ୍ତରର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବିଛା ଯାଇଥିବ।

ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ନଡ଼ାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପୁନଃ ୫ ଇଞ୍ଚ ବହଳର ନଡ଼ା ବିଛାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ନଡ଼ା ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବିଛା ଯାଇଥିଲେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ତର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବିଛା ଯାଇଥିବା ଦରକାର। ନଡ଼ା ଉପରେ ୧ମ ସ୍ତର ପରି ୨ୟ ଭାଗ ମଞ୍ଜି ଓ ୨ୟ ଭାଗ ତାଲି ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଡ଼ିର ୩ୟ ସ୍ତର କରନ୍ତୁ। ଏହା ୨ୟ ସ୍ତରର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ୫ ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ତିଆରି କରାଯିବ। ଏହି ସ୍ତରର ସମୁଦାୟ ଅଂଶରେ ବଳକା ଦୁଇ ଭାଗ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଓ ତାଲି ଗୁଣ୍ଡ ବିଛାଇ ଦିଆଯାଏ।

୩ୟ ସ୍ତର ନଡ଼ାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପୁନଃ ୩ ଇଞ୍ଚ ବହଳର ପତଳା ନଡ଼ା ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଭାଡ଼ିର ଶେଷ ବା ଡାଙ୍କୁଣୀ ସ୍ତର। ୧ମ ଓ ୨ୟ ସ୍ତରର କେବଳ ବାହାର ପଟେ ଛତୁ ଫୁଟୁଥିବା ବେଳେ ୩ୟ ସ୍ତରରେ ସବୁଆଡ଼େ ବେଶି ଉପାଦାନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଓ ଏହା ଉପରେ ପତଳା ଡାଙ୍କୁଣୀ ସ୍ତର ଥିବାରୁ ଉଭୟ କଡ଼ ଓ ସମୁଦାୟ ଉପର ଅଂଶରେ ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଡ଼ି ଉପରୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଦୁଇ ହାତ ଦ୍ଵାରା ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭାଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ମଞ୍ଜି ଓ ତାଲିଗୁଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ନଡ଼ା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏହାଦ୍ଵାରା ଛତୁ ଫାମ୍ ଭଳି ଭାବରେ ମାଡ଼ିପାରିବ।


ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ଭାଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାହାକୁ ଏକ ପତଳା ପଲିଥିନ୍ ଦ୍ଵାରା ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଏ। ୮ରୁ ୧୦ ଦିନ ପରେ ଶାଗୁଦାନୀ ପରି କଡ଼ ସବୁ ଦେଖାଗଲେ ଭାଡ଼ିରୁ ପଲିଥିନ୍ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ୩-୪ ଦିନ ପରେ ବା ମଞ୍ଜି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ୧୫ଦିନ ବେଳକୁ କଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଅମଳଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।

ଅମଳ

ସାଧାରଣତଃ ଅଣ୍ଡାକୃତି ଅବସ୍ଥା କଡ଼ ସମୟରେ ଛତୁ ଡୋଳିଦେବା ଦରକାର । ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଛତୁ ଫୁଟିଯାଇ ଛତା ପରି ହୋଇଯାଏ । ବଜାରରେ କଡ଼ ଛତୁର ଚାହିଦା ଅଧିକ । ଛତୁର ସମୁଦାୟ ଅଂଶକୁ ଭାଙ୍ଗିବୁ ଡୋଳି ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ୧୫ଦିନ ବେଳକୁ ଫୁଟିଥିବା ଛତୁ ଏକା ଦିନରେ ନ ଡୋଳି ୨-୩ ଦିନ ଧରି ଅମଳ କରନ୍ତୁ । ସମୁଦାୟ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନର ଶତକଡ଼ା ୮୦ରୁ ୮୫ ଭାଗ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ଫୁଟିଥାଏ । ବଳକା ୧୫ରୁ ୨୦ ଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨-୩ ଥରରେ ମିଳିଥାଏ । ପ୍ରଥମ ଅମଳର ପ୍ରାୟ ୮-୧୦ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଛତୁ ଫୁଟେ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୮୫ ଭାଗ ଛତୁ ଅମଳ ହେଉଥିବାରୁ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଲାଭକାରୀ ହେଉଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ପ୍ରଥମଥର ଅମଳ ପରେ ଛତୁ ଭାଙ୍ଗିଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ।

ଧୂଳିଗୀ ଛତୁ

ଏହା ଏକ ଶୀତଦିନିଆ ଛତୁ । ଏହାର ଆକୃତି ସମୁଦ୍ରର ଶାମାକୁ ପରି ହୋଇଥିବାରୁ ଧୂଳିଗୀ ଛତୁର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶାମାକା ଛତୁ ବା ଅଏଷ୍ଟର ମସରୁମ୍ । ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଏହି ଛତୁ କାଠ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଗଣ୍ଡିରେ ଫୁଟିଥାଏ । ତେଣୁ କେତେକ ଏହାକୁ କାଠ ଛତୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ଛତୁ ତୁଳନାରେ ଧୂଳିଗୀ ଛତୁର ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦୃଢ଼ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ୨୦ ରୁ ୩୦° ସେଲସିୟସ୍ ଉତ୍ତାପରେ ଧୂଳିଗୀ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଏ । ଏହାର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୁବ୍ ସରଳ ଓ ଚାଷ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ । ଧାନ ଓ ଗହମ ନଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କୃଷିଜାତ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ମକା କାଣ୍ଡ, କଦଳୀ ପତ୍ର, ବିଲାତି ଦଳ, କରଡ଼ ଗୁଣ୍ଡ, ବ୍ୟବହୃତ ଖବରକାଗଜ, ନଡ଼ିଆ କତା, ଆଖୁ ଛେଦା, ଅଳସୀ ଓ ରାଣୀ କାଣ୍ଡ, ସୋୟାବିନ୍ କାଣ୍ଡ, ନଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଆ ଗଛର ପତ୍ର, ବାଦାମ ତୋପା, ଚବର ଓ କଫି ଶିଳ୍ପର ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ



ବ୍ୟବହାର କରି ଧୂଳିଗୀ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛତୁ ତୁଳନାରେ ଧୂଳିଗୀ ଛତୁର ଜୈବ ଦକ୍ଷତା ବା ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ଅଧିକ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗୁଣିଲା ନଡ଼ାରୁ ୧୦୦ରୁ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ ପାଳ ଛତୁ ଓ ୨୦୦ରୁ ୮୦୦ ଗ୍ରାମ ଦୁଧ ଛତୁ ଅମଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମ ପରିମାଣର ନଡ଼ାରୁ ୧୦୦୦ ଗ୍ରାମ ବା ଏକ କିଗ୍ରା ଧୂଳିଗୀ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଏତଦବ୍ୟତୀତ ଏହାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାରି ରହିଛି ଯାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ । ଧୂଳିଗୀ ଛତୁର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ଲୁରେଟସ୍ ସ୍ପେସିଜ୍ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛତୁ ତୁଳନାରେ ଧୂଳିଗୀ ଛତୁର ବହୁତଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକାରି

ରହିଛି । ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଶାମୁକା ପରି । ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଥାଏ । ଏହାର ତଳ ଭାଗରେ ଥିବା ଗାଲି ସବୁ କାଣ୍ଡର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବାହାରି ଧାର ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବିଥାଏ ।

ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା କିଷମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲୁରୋଟେସ୍ ସାଜୋରକାକୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ । ଓଡ଼ିଶାର ଛତୁ ଚାଷମାନେ ଏହି କିଷମଟିକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାର ରଙ୍ଗ କଷରା । ଅନ୍ୟ କିଷମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ଲୋରିଡା, ଫ୍ଲୁବେଲାଟେସ୍, ସାପିଡସ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରାଲସ୍, ଏରିଞ୍ଜାଇ, ସିଟ୍ରିନୋପିଲିଟାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ଲୁରୋଟେସ୍ ଇଓସ୍ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ଗୋଲାପୀ କିଷମ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଲୋକପ୍ରିୟ ସାଜୋରକାକୁ କିଷମଠାରୁ ଏହା ୬-୮ ଡିଗ୍ରୀ ଆଗରୁ ଅମଳ ହୁଏ । ପ୍ଲୁରୋଟେସ୍ ଜାମ୍ବୁର ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଷମ ଦେଖିବାକୁ ଇଷତ ଗୋଲାପୀରୁ ଗାଢ଼ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ । ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ନୀଳ ଧୂଳିଗୀ ଛତୁ (ହିସ୍ପିକାଲଗସ ଅଲମାରିୟସ୍)ର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଲୋକପ୍ରିୟ ସାଜୋରକାକୁ କିଷମଠାରୁ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ।

ଧୂଳିଗୀ ଛତୁରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ :

୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଚଟକା ଛତୁରେ ୨.୬୮ ଗ୍ରାମ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର, ୦.୬୫ ଚର୍ଚ୍ଚି, ୧.୦୮ ଗ୍ରାମ୍ ତନ୍ତୁ, ୦.୯୩ ଗ୍ରାମ୍ ଭସ୍ମ ଥାଏ (ସୌଜନ୍ୟ:କାକିଆ ବାନୋ, ୧୯୬୬) । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାରୀ ଭିଟାମିନ, ଧାତୁଲବଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକଗୁଣ ରହିଛି ।

ଧୂଳିଗୀ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଣିପାଗ

ଉତ୍ତାପ : ଧୂଳିଗୀ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ୨୦ ରୁ ୩୦° ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଚାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଛତୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଷମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁକୂଳ ଚାପମାତ୍ରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ନଭେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଆର୍ଦ୍ରତା : ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ୬୦ ରୁ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିବା ଦରକାର । ଆର୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଥିଲେ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷରେ ଯେପରି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଛତୁ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରଖା କରାଯାଇଥାଏ, ସେପରି କରିବାକୁ ହେବ ।

ଆଲୋକ : ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆଲୋକର ପରିମାଣ ୨୦୦ ଲକ୍ଷ । ଏହି ଆଲୋକ ଦୈନିକ ୮-୧୨ ଘଣ୍ଟା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଛତୁ ଫୁଟିବା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଲୋକ ନ ମିଳିଲେ, ଛତୁର କାଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଲମ୍ବା ହୁଏ, ଗୋପିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଓ ଚାଷର ଅବଧି ବଢ଼ିଯାଇ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଏ ।

ଅମ୍ଳଜାନ-ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ନ : ଧୂଳିଗୀ ଛତୁର ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ନ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି । ଛତୁର ଦୈନିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ନ ଓ କମ୍ ଆଲୋକ ଦରକାର କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଛତୁ ଫୁଟିବା ସମୟରେ କମ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ନ (ବେଶୀ ଅମ୍ଳଜାନ) ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିପାଇଁ ଛତୁ ଫୁଟିବା ସମୟରେ ପବନ ଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଛତୁ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ନ ବ୍ୟାସର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରାଯାଏ । ନଚେତ୍ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକର କାଣ୍ଡ ବା ତେମ୍ପ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଓ ଗୋପି ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ କାହାକି ପରି ଦେଖାଯାଏ ।

ଆଦର୍ଶ ଛତୁଫାର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଘର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରଥମ ଘରଟି ପ୍ରାୟତଃ ନିରୁଜ୍ଜ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ ଆଲୋକ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ୧୫ଦିନ ଛତୁ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯିବ । ଅନ୍ୟ ଘରଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଖୋଲା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଘର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଲୋକ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ । ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟରେ ଫିମ୍ପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଛତୁ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକ ୨ୟ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥାଏ ।

ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ : ସାଧାରଣତଃ ୮୦ସେମି x ୪୦ ସେମି ବା ୬୦ ସେମି x ୪୦ ସେମି ଗୋଲାକୃତି ପଲିଥିନ୍ ଥିକି ମଧ୍ୟରେ ଧୂଳିଗି ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ୧ ରୁ ୧୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ

- ୧ ଦେଶୀ, ଧଳାମୂଳିଆ, ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼ିନଥିବା ଚାଣ, ମୋଟା ନଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ । ଏଥିରୁ ପତ୍ର ଅଂଶ ବାଦ ଦେଇ ବା' ବା ନଡ଼ାକଟା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ୨-୩ ଇଞ୍ଚ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କଟାଯାଏ ।
- ୨ ଏହାପରେ କଟା ନଡ଼ାକୁ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଭରା କୁଣ୍ଡରେ ୬-୮ ଘଣ୍ଟା ବତୁରା ଯାଇଥାଏ ।
- ୩ ଗରମ ପାଣି ବା ବାମ୍ଫ ଦ୍ୱାରା ବତୁରା କଟା ନଡ଼ାକୁ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝାଇ ଦିଶୋଧନ କରାଯାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ନଡ଼ାରେ ଥିବା ହାନୀକାରକ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଏ ।

- ୧୬ ବିଶେଷତ ବତୁରା ନଡ଼ାରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପରିଷ୍କାର ଚଟାଣ ବା ପଲିଥିନ ଉପରେ ବିଛା ଦିଆଯାଏ । ଖରାରେ ନ ଶୁଖାଇ ମୁକ୍ତ ପବନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଛାଇ ଜାଗାରେ ଶୁଖାଇ ସବୁଠାରୁ ଭଲ । ଘର ମଧ୍ୟରେ ନଡ଼ା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ।
- ୧୭ ନଡ଼ାରେ ମଞ୍ଜି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ଆନୁମାନିକ ୫୦-୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳାୟ ଅଂଶ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ୧୮ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ମଞ୍ଜିକୁ ସମାନ ୪ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ।
- ୧୯ ଦୁଇ ମୁହଁ ଥିବା ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗର ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ବାନ୍ଧି ତା' ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ନଡ଼ା ବିଛାଇ ତା' ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଭାଗ ମଞ୍ଜି ଓ ସିଝା ଗହମ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏହିପରି ୪ ସ୍ତର କରି ସବା ଉପର ସ୍ତରକୁ କିଛି ନଡ଼ା ବେଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ମଞ୍ଜି ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ପ୍ରାୟତଃ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗର ଧାର ଆଡ଼କୁ ରହେ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ ।
- ୨୦ ପଲିଥିନ୍ର ଉପର ଖୋଲା ମୁହଁକୁ ବାନ୍ଧି ସେଥିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ୧୫-୨୦ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା କରିଦିଆଯାଏ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ ଓ ଏହାର ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ-ଅମ୍ଳାରକାମ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।
- ୨୧ ଏହିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ୧୫ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିମ୍ପି ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଛତୁ ଫିମ୍ପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ଏକ ଧଳା ପିଣ୍ଡୁଳା ପରି ହୋଇଯାଏ ।
- ୨୨ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଥିନ୍ରୁ ପିଣ୍ଡୁଳାଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ଖୋଲା ଘରେ ଶିକା କରି ଚାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ।
- ୨୩ ଫିମ୍ପି ପିଣ୍ଡୁଳା କାଢ଼ିବାର ଦିନକ ପରେ ପାଣି ସ୍ତେ କରି ଓଦା ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ । ଦିନକୁ କେତେ ଥର ପାଣି ଦେବାକୁ ହେବ, ତାହା ନଡ଼ା ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ଥିବା ଜଳାୟ ଅଂଶ, ଘର ମଧ୍ୟରେ ପବନ ଚଳାଚଳ, ପାଣିପାଗର ଅବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।
- ୨୪ ନଡ଼ାରେ ମଞ୍ଜି ପ୍ରୟୋଗର ୨୨ଦିନ ବେଳକୁ ବା ପଲିଥିନ୍ରୁ ନଡ଼ା ପିଣ୍ଡୁଳା ବାହାର କରିବାର ୭ ଦିନ ପରେ ଛତୁ କଢ଼ି ଆସେ । ୩-୪ ଦିନ ପରେ ଏହା ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ

ହୁଏ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଛତୁ ଅମଳର ୭-୮ ଦିନ ପରେ ୨ୟ ଥର ଛତୁ ଫୁଟେ । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୩-୪ ଥର ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ ।

୧୬ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଛତୁ ଅମଳ ପରେ ନଡ଼ା ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ନଷ୍ଟ ବା ପାଣିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଆମ୍ବୁଡ଼ି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଅମଳ ପରେ ରହିଯାଇଥିବା ଛତୁ ଫିମ୍ପିର ବହଳ ଆବରଣ ବାହାରିଥାଏ ଓ ଫିମ୍ପି ସ୍ଥାଣୁ ନ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଅମଳ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

୧୭ ଛତୁଟିର ଧାର ଭିତରକୁ ମୋଡ଼ି ହେବାର ଦେଖାଗଲେ ତା'ର ମୂଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ଛତୁ ଅମଳ କରାଯାଏ । ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗରୁ ୨ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତୁ ଅମଳ କରାଯାଇପାରେ ।

ଦୁଧ ଛତୁ

ଏହା ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଖାଦ୍ୟପୋୟୋଗୀ ଛତୁ । ଭାରତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ହିଁ ଏହି ଛତୁ ପ୍ରଥମେ ଆର୍.ପି. ପୁରକାୟସ୍ଥା ନାମକ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ୧୯୭୪ ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୧୯୭୬ ମସିହାରେ । ଏହାର ରଙ୍ଗ ଦୁଧ ପରି ଧଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଏପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି । ପାଳ ଛତୁ ପରି ଏହା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ । କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଛତୁଗୁଡ଼ିକ



ତୁଳନାରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବେଶ୍ ବଡ଼। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଛତୁର ହାରାହାରି ଓଜନ ୧୦୦ ରୁ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ୭୦୦ରୁ ୮୦୦ ଗ୍ରାମର ଛତୁ ଉପାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ୧୯୯୪ ମସିହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଷ ପଦ୍ଧତିର ଅଧିକତର ବିକାଶ ସହିତ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଳ ଛତୁ ଓ ଧୂଳିରା ଛତୁ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏହା ସେପରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚମକୁର ଆକୃତି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ, ବୃହତ୍ ଆକାର, ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି, ସରଳ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଭୟ ଚାଷୀ ଓ ଖାଦ୍ୟପାନକ ପାଖରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।

ଖାଦ୍ୟଗୁଣ : ଦୁଧ ଛତୁ ଖାଦ୍ୟଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉଦୟପୁର କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତା.ଅନିଲା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଖିଲା ଓଜନ ଭିତ୍ତିରେ ଏଥିରେ ଶରକଡ଼ା ୧୭.୨୯ ଭାଗ ପୁଷିକାର, ୬୪.୨୬ ଭାଗ ଶ୍ୱେତସାର, ୪.୧ ଭାଗ ଚର୍ବି ଓ ୩.୨ ଭାଗ ଚକ୍ରକାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ଧାତବ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ଛତୁରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୋଟାସିୟମ, କ୍ୟାଲିୟମ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ଲୌହ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ।

ପାଣିପାଗ : ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ଦୁଧ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ। ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଳ ଛତୁ ପରି ପାଣିପାଗ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଛତୁ ଘର ମଧ୍ୟରେ ୨୫ରୁ ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ଓ ବାୟୁରେ ଆପେକ୍ଷିତ ଆର୍ଦ୍ରତା ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳେ। ଘର ମଧ୍ୟରେ ପବନ ଚଳାଚଳର ପରିମାଣ ଓ ବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଧ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ।

ଚାଷ ପାଇଁ ଉପାଦାନ : ପାଳ ଛତୁ ପରି ଦୁଧ ଛତୁର ପାଣିପାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାୟ ଏକାପରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଧ ଛତୁର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଧୂଳିରା ଛତୁ ପରି ହୋଇଥାଏ। ୬୦ସେମି x ୪୦ ସେମି ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଧ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ ପାଇଁ ୨/୩ ବିଡ଼ା ନଡ଼ା (ପ୍ରାୟ ୧ କିଗ୍ରା) ଓ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ଛତୁ ମଞ୍ଜି (୨୦୦ ଗ୍ରାମ) ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।

ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ :

ପ୍ରଥମେ ଭଲ ନଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରୁ ପତ୍ର ଅଂଶ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଏ ଓ ନଡ଼ାକୁ ୨-୩ ଇଞ୍ଚ ଆକାରରେ କାଟି ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ୬ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ବତୁରାଯାଏ। ଭିଜା ନଡ଼ାକୁ ୩୦ରୁ ୪୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝାଇ ବିଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନଡ଼ାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଫିଙ୍ଗିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ନଡ଼ାକୁ ପରିଷ୍କାର ଚଟାଣ ବା ପଲିଥିନ୍ ଉପରେ ପତଳା ଭାବରେ ଖେଳାଇ ପବନରେ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ୫୦ରୁ ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ବଡ଼ର ରହିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ବିହନକୁ ବୋତଲରୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ୩ ଭାଗ କରନ୍ତୁ। ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗରେ ୩ ଇଞ୍ଚ ବହଳର ନଡ଼ା ବିଛାଇ ତା' ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ବିହନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ତିନି ସ୍ତର କରନ୍ତୁ। ୩ୟ ସ୍ତର ନଡ଼ା ଉପରେ ପତଳା ଭାବରେ ଏକ ଇଞ୍ଚ ବହଳର ନଡ଼ା ବିଛାଇ ପଲିଥିନ୍ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପଲିଥିନ୍ର ଚାରିପଟେ ୧୫-୨୦ଟି କଣା କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଛତୁ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଫିଙ୍ଗି ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ୧୫ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଧ ଛତୁ ଫିଙ୍ଗିଗୁଡ଼ିକ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଡ଼ିଯାଏ ଓ ବ୍ୟାଗଟି ବାହାରକୁ ଧଳା ଜଣାପଡ଼େ। ଏହା ପରେ ବ୍ୟାଗର ଉପର ମୁହଁ ଖୋଲି ପଲିଥିନ୍‌ଟିକୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି ନଡ଼ାର ଉପରସ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବ। ବ୍ୟାଗ ଖୋଲିବା ପରେ ଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଗ ଖୋଲିସାରିବା ପରେ ନଡ଼ାର ପରସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଇଞ୍ଚ ବହଳର ପୁରୁଣା ବିଶୋଧିତ ଜିଆ ଖତ ବା ଗୋବରଖତ ବିଛାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ କ୍ୟାସିଙ୍ଗ କହନ୍ତି। ମାଟି ଓ ଖତକୁ ସମାନ ଅନୁପାତରେ (୧:୧) ମିଶାଇ କ୍ୟାସିଙ୍ଗ ସ୍ତର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ଅମଳ : ବ୍ୟାଗ ଖୋଲିବାର ପ୍ରାୟ ୧୫-୨୦ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ୩୦-୩୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଧ ଛତୁ କଢ଼ ସବୁ ବାହାରେ ଓ ପ୍ରାୟ ୫-୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଢ଼ଗୁଡ଼ିକର ମଝି ଅଂଶ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶଠାରୁ ଅଧିକ ଫୁଲିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷିପ୍ରାସ୍ତ ଛତୁର ଗୋପି ୮ରୁ ୧୦ ସେମି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫୁଟିଥିବା ଛତୁ ଏକାଥରରେ ଅମଳ କରିଦେବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷିତ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ସାବଧାନତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ।

ଦୁଧ ଛତୁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ :

୧. ଚମକାର ଆକୃତି, ଲୋଭନୀୟ ରଙ୍ଗ, ବୃହତ୍ ଆକାର ପ୍ରଭୃତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୁଧ ଛତୁ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦର ଲାଭ କରିପାରିବ ।
୨. ଦୁଧ ଛତୁର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ।
୩. ଅମଳ କରିସାରିବା ପରେ ଦୁଧ ଛତୁ ୩-୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କୃତ୍ରିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ସତେଜ ରହିପାରେ । ପାଳ ଛତୁ ଓ ଧୂଜିରୀ ଛତୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦-୧୨ ଘଣ୍ଟା ଓ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଟକା ରହିଥାଏ ।
୪. ପାଳ ଛତୁ ଓ ଧୂଜିରୀ ଛତୁ ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତା'ର ପରିମାଣ ଏତେ କମିଯାଏ ଯେ ସେଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ସେହି ପରିମାଣର ଦୁଧ ଛତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିବାରର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରାଯାଇପାରେ । ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଏହାର ଆକାର ବେଶୀ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ ମାତ୍ର ଓ ସ୍ବାଦ ଭଲ ଲାଗେ ।
୫. ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ୮-୯ ମାସ ଦୁଧ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ।
୬. ଦୁଧ ଛତୁର ଜୈବ ଦକ୍ଷତା ଅଧିକ । ଗୋଟିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ାରୁ ୧୦୦ରୁ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ ପାଳ ଛତୁ ଅମଳ ହୋଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ୬୦୦ରୁ ୮୦୦ ଗ୍ରାମ ଦୁଧ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ ।
୭. ପାଳ ଛତୁ ଓ ଦୁଧ ଛତୁ ଏକ ସମୟରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବାରୁ ପାଳ ଛତୁ ଭାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ ନଡ଼ା ବିଡ଼ାର ଅଗ, ଫୁଲ କାଟି ସାଇକ୍ କରିବା ପରେ ବାହାରୁଥିବା କଟା ନଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଧ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ।