

ପନିପରିବା ତଳି ଉତ୍ପାଦନ

ଆଲେଖ୍ୟ:

ଶ୍ରୀମତୀ ହରପ୍ରିୟା ସେଠୀ (କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧକ)
ଶ୍ରୀମତୀ ସମ୍ପିତା ପାଲ, ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଗୃହ ବିଜ୍ଞାନ)
ଡ. ମୟୂରୀ ସିଂଘ ସାର୍ଦାର, ବୈଜ୍ଞାନିକ (କୃଷି ସଂପ୍ରସାରଣ)

ସଂପାଦକ:

ଶ୍ରୀ ତପନ କୁମାର ଦାସ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ବୌଦ୍ଧ

ପ୍ରକାଶକ: କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ବୌଦ୍ଧ

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ : ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୩

ମୁଦ୍ରଣ:

ଅଙ୍କିତା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଫୋନ୍ ୯୪୩୭୦୭୭୩୩୭

PANIPARIBA TALI UTPADANA

By

Mrs. Harapriya Sethi, (Farm Manager)
Mrs. Sasmita Pal, Scientist (Home Science)
Dr. Mayuri Singh Sardar, Scientist (Agril Extn.)

Editor


Mr. Tapan Kumar Das
Sr. Scientist and Head
Krishi Vigyan Kendra, Boudh

Published by: Krishi Vigyan Kendra, Boudh

First Edition : December, 2023

Printed by

Ankita Graphics, Bhubaneswar.
Cell : 9437077337 / saroj77337@gmail.com



ପନିପରିବା ତଳି ଉତ୍ପାଦନ

ମୁଖ୍ୟତଃ ପନିପରିବା ଫସଲ ପାଇଁ ତଳିପତ୍ତିରେ ତଳି କରି ଜମିରେ ଲଗାଯାଏ। ତଳି ବା ଚାଉ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁଗଛ। ଏହା ନରମା ଓ ସୁନ୍ଦର ଚିଣିଷ ହୋଇଥିବାରୁ ମାନବ ଶିଶୁ ପରି ଅଧିକ ଯତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଭଲ ତଳିରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଓ ଭଲ ଫଳେ। ତଳି ଦୁର୍ବଳ, ରୋଗିଣୀ ହେଲେ ପରେ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ରୁଗିଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ଭଲ ଫଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କିପରି ଭଲ ପନିପରିବା ତଳି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଭାଇ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।

ତଳିପତ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ :

ଦୋରସା ମାଟି ତଳିପତ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ପଥୁରିଆ, ନିରାସା ମାଟିରେ ତଳି ଭଲ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ମାଟି ଯଦି ଅଧିକ ବାଲିଆ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେଥିରେ ଚିକିଏ ସତ୍ତା ଗୋବରଖତ ମିଶାଇବାକୁ ହେବ। ମାଟି ଯଦି ଅଧିକ ଚିକିଟା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେଥିରେ କିଛି ବାଲିଆ ମାଟି ମିଶାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।

ପନିପରିବା ତଳି ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ତଳିପତ୍ତି କରାଯାଏ। ତଳିପତ୍ତି ପାଇଁ ଚିକିଏ ଉଜା ଜମି ଭଲ, ଯେପରି ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଠାରେ ପାଣି ଜମି ନରହି ତଳିକୁ



ଗଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ବା ଆବଶ୍ୟକ ଜାଗାରେ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଈଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଘାଓ ଚୋରଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ । ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜଳର ସୁବିଧା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଚଳିପଟିରେ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଓଳି ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଭଲ ବିହନ :

କଥାରେ ଅଛି ମଞ୍ଜି ଗୁଣେ ଓ ଗଛକୁ ନେଇ ଫଳ । ଭଲ ବିହନରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳେ । ଭଲ ବିହନ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ।

୧. ବିହନ ନିଦା, ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ପ ଓ ଓଜନିଆ ହୋଇଥିବ ।
 ୨. ଉନ୍ନତ କିସମର ହୋଇଥିବ ।
 ୩. ଅଧିକ ଉପାଦାନ କ୍ଷମତା ଥିବ ।
 ୪. ପରିଷ୍କାର ଥିବ, ସେଥିରେ କାଠିକୁଟା ବାଲି, ଘାସ ବା ବାଲୁକା ମଞ୍ଜି ମିଶି ନଥିବ ।
 ୫. ପୋକ ବା ରୋଗିଣୀ ହୋଇନଥିବ ।
 ୬. ବିହନର ପୋକ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
 ୭. ଉଚ୍ଚବିହନ ଭଲ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଚାଗର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବ ।
 ୮. ବିହନର ଗଜା ହେବା ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ନବେ ଭାଗ ଥିବ ।
- ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କଲାପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମାଟି କୁଣ୍ଡରେ ୧୦ଟି ମଞ୍ଜି ପୋତିଦେଇ ପାଣି ସିଞ୍ଚିବା ଉଚିତ୍ । ମଞ୍ଜି ଭଲ ଥିଲେ ୫-୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଜା ହୋଇଯିବ । ସେଥିରୁ ବିହନର ଗଜା ହେବା ଶକ୍ତି ଜଣାଯିବ ।

ବିହନ ନିରୂପଣ: ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଥିବା ବିହନ ମିଳୁଛି ।

୧. ଦେଶୀ ବିହନ, ୨. ଉନ୍ନତ ବିହନ, ୩. ହାଇବ୍ରିଡ଼/ଶିକର ବିହନ
୧. ଦେଶୀ ବିହନ କମ୍ ଖତ ସାର ଦେଇ ଚାଷ କଲେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ କିସମ ଓ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖତ ସାର ଓ ପୋକରୋଗ ନାଶକ ଔଷଧ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।
୨. ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ବିହନ ମିଳୁଛି । କେତେକ ବିହନ ବର୍ଷା ଦିନେ ଭଲ ଫଳେ, କେତେକ ଶୀତ ବା ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଭଲ ଫଳେ, ସେହିପରି

କେତେକ ବିହନ ଖରାଦିନେ ଭଲ ହୁଏ, ଯାହା କମ୍ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସହିପାରେ । କେତେକ ବିହନ କିସମ ଅଛି ଯାହାକି ବର୍ଷ ଚମାମ ସବୁ ସମୟରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ । ଏହି କିସମ ଋତୁ ବାରେ ନାହିଁ ।


୩. ଏହାବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିପରିବା ଫସଲର ସଫଳ କିସମ, ମଧ୍ୟମ କିସମ ଓ ବିଳମ୍ବ କିସମ ବିହନ ମିଳୁଛି । କେତେକ କିସମ ଅଛି ଯାହାକି ଅନିମେଶ ଚାଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳେ ଓ ସେଥିରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳେ ।

୪. ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିପରିବାର ରୋଗ ପୋକ ପ୍ରତିରୋଧକ କିମ୍ବା ରୋଗପୋକ ସହଣୀ ଶକ୍ତି ଥିବା ବିହନ କିସମ ମିଳୁଛି ।

ତେଣୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧାରରେ ରଖି ବିହନ ନିରୂପଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଚଳିପଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ଚଳିପଟି କରିବା ପାଇଁ ମାଟିକୁ ହଳକରି ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଗୋଡ଼ି, ପଥର, କାଠି, କୁଟା, ଘାସ ବାହାର କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚଳି ପଟିର ଉଚ୍ଚତା ଜମିପତ୍ତନ ୦।୫ ମି. ୧୦ ଇଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପଟିର ଚାରିପଟୁ ମାଟି ନେଇ ପଟି ଉପରେ ପକାଇଲେ ପଟି ପତ୍ତନ ଉଜ୍ଜା ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଚଳିପଟିର ଆକାର ଚଉଡ଼ାରେ ୩ ଫୁଟ ଓ ଲମ୍ବା ୧୦ ଫୁଟ ରଖିବା ଭଲ । କାରଣ ଚଉଡ଼ା ୩ ଫୁଟ ରହିଲେ ବାହାରେ ଥାଇ ପଟିରୁ ଘାସ ବାହାରି ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ । ପଟି ଉପରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ନଡ଼ା ଜତାଦି ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ ମାଟିରେ ଥିବା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ମରିଯିବେ । ମଞ୍ଜି ଚୁର୍ଣ୍ଣିବାର ୨ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଚଳିପଟିର ମାଟି ସହିତ ନିର୍ଭୁକ୍ତ ପାଉଁଶର ଏକର ପ୍ରତି ୫ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ମିଶାଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ମାଟିରେ ଥିବା ରୋଗଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଆନ୍ତି ।




ପ୍ରତି ୩୦ ବର୍ଗ ଫୁଟ (୩ ଫୁଟ x ୧୦ ଫୁଟ) ଚଳିପତ୍ତିରେ ଦୁଇ ଝୁଡ଼ି (ପ୍ରାୟ ୨୦ କିଗ୍ରା) ସତ୍ତା ଗୋବରଖତ, ଘୁରିଆ ୩୫ ଗ୍ରାମ୍, ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସଫେଟ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଓ ମ୍ୟୁରେଲ୍ ଅର୍ଥ ପଟାସ ୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ଭଲଭାବେ ମିଶାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ବିହନ ବିଶୋଧନ :

ବିହନରୁ କାଟିକୁଟା, ବାଲୁଜା ଓ ଘାସ ମଞ୍ଜି, ଫମ୍ପା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରି ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଔଷଧ ଦ୍ଵାରା ବିଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧ କି.ଗ୍ରା ବିହନ ସହିତ ୩ ଗ୍ରାମ୍ କ୍ୟାପଟାନ କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ୍ ବାରିଷ୍ଟିନକୁ ଗୋଟିଏ ଟିଣ ଡବାରେ ନେଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ଭଲ ଭାବରେ ହଲାଇଦେଲେ ସେହି ଔଷଧ ମଞ୍ଜି ସହିତ ଗୋଳାଇ ହୋଇଯାଏ । ବିଶୋଧିତ ବିହନ ବୁଣିଲେ ମାଟିରେ ଥିବା ରୋଗଜୀବାଣୁ ହଠାତ୍ ମଞ୍ଜିକୁ କିମ୍ବା ଶିଶୁଗଛକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।


ବିହନ ବୁଣା :

ଚଳିପତ୍ତି ଉପର ସମତୁଲ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଉଡ଼ାପତ୍ତିଆ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ୬ ଇଞ୍ଚ ଅନ୍ତରରେ ସିଧାକରି ଟାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଗାର ଟାଣିବା ବେଳେ ଏହା କେତେ ଗଭୀର ହେବ ତାହା ମଞ୍ଜିର ଆକାରକୁ ନେଇ ଠିକ୍ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯଥା: ବଡ଼ ଆକାରର ମଞ୍ଜି (ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ) ଇତ୍ୟାଦି ଟିକିଏ ଅଧିକା ୨.୫ ସେମି. ଗଭୀରରେ ପଡ଼ିବ ଓ କୋଟି ପରି ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ଟିକିଏ କମ୍ (୨ ସେମି) ଗଭୀରରେ ପଡ଼ିବ । ମଞ୍ଜିକୁ ବେଶୀ ବହଳା କରି ବୁଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ବହଳା କଲେ ବେଶୀ ଗଛ ଉଠିବ ଓ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ତେଜୀ ଓ ସରୁଆ ହୋଇ ବଢ଼ିବ । ବୁଣିସାରିବା ପରେ ହାତରେ ମାଟି ଚଳାଇ ମଞ୍ଜିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ହାତ ପାପୁଲି ଦ୍ଵାରା ସରୁଆଡ଼େ ଚାପି ଚାପି ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଚଳି ପତ୍ତିରେ ଚାରିପଟ ଧାରରେ ମାଲଧୁଆନ୍ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରପାଇରିଫିସ୍ ଗୁଣ୍ଡା ଧାର କରି ବୁଣି ଦେଲେ ଚଳିପତ୍ତିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିବ ନାହିଁ ।



ଚଳିପତ୍ତି ଆଙ୍କାଦ :

ମଞ୍ଜି ବୁଣା ସରିବା ପରେ ଚଳିପତ୍ତି ଉପରେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ାକୁ ପତଳା ଭାବରେ ବିଛାଇ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଏହାଦ୍ଵାରା ମଞ୍ଜି ଉଷ୍ମମ୍ବ ପାଏ ଓ ମାଟିର ବତର ଠିକ୍ ରହେ ।



ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା :

ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଅନୁକୂଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

୧. ଜଳ, ୨. ବାୟୁ, ୩. ଉତ୍ତାପ


୧. ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ଉତ୍ତାପ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନପାଇଲେ ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଚଳିପତ୍ତିର ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳକୁ ମାଟି ଟିକିଏ ଓଦାଳିଆ ଥିବ, ଯେପରି ମାଟିକୁ ହାତରେ ମୁଠା କଲେ ତାହା ମୁଠା ହୋଇଯାଉଥିବ ଓ ୩-୪ ଫୁଟ ଉପରୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ ।

୨. ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଓ ଚଳିପତ୍ତିକୁ ଜମିପତ୍ତନ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଓ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ଠିକ୍ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ପଟାଳି ମାଟି ଭିତରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଭଲ ରୂପେ ହୋଇପାରେ । ମାଟିରେ ଜଳଭାଗ ଅଧିକ ଥିଲେ ବାୟୁ ଚଳପ୍ରଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

୩. ଚଳିପତ୍ତି ଟିକିଏ ଉଷ୍ମମ୍ବ ରହିବା ଭଲ । ଏହାଦ୍ଵାରା ମଞ୍ଜି ଉତ୍ତାପ ପାଏ । ତେଣୁ ଖରା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଦିନର ଖରା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଉଚିତ୍ । ତା' ଛଡ଼ା ପତ୍ତି ଉପରେ ପକାଯାଇଥିବା ନଡ଼ା ଆଙ୍କାଦ ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ମମ୍ବ ଯୋଗାଇଥାଏ ।


ଜଳସେଚନ :

ତଳିପତ୍ତିର ମାଟିରେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ବତର ଥାଏ ତେବେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ଜଳସେଚନ ଅନବଶ୍ୟକ । ଯଦି ମାଟି ପୁରା ଶୁଖିଲାଥାଏ, ତେବେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିସାରିବା ପରେ ନଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ତା' ପରେ ଝରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ । ଗମାଗୋ ଓ ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି ପ୍ରାୟ ୫-୬ ଦିନରେ ଗଜା ହୋଇଥାଏ । ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ପ୍ରାୟ ୮ ଦିନରେ ଗଜା ହୁଏ । ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେବାର ଦେଖି ନଡ଼ା ଆଛାଦନ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ । ତା' ପରେ ମାଟିର ବତର ଓ ପାଗକୁ ଦେଖି ପ୍ରତିଦିନ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଝରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

**ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ :**

ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେବାର ୮-୧୦ ଦିନ ପରେ ଧାତି ମଝିରେ ମାଟିକୁ ସରୁ ଖୁରପି ଦ୍ଵାରା ଖୁସାରି ଘାସ ବାଛି ଦେଇ ଗଛମୂଳକୁ ମାଟି ଟେକିଦେବା ଉଚିତ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଗଛ ମୂଳ ଦସ୍ତ ହୁଏ ଓ ଗଛ ସିଧା ହୋଇ ବଢେ । ଯଦି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସାର ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଗଛ କମ୍ ବଢୁଥିବା ଜଣାପଡେ, ତେବେ ଗଛ ମୂଳଠାରୁ ୨ ଇଞ୍ଚ ଛାଡି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ (୩ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା, ୧୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ପଟାଳି ପାଇଁ ମାତ୍ର ୨୫ ଗ୍ରାମ ଯୁରିଆ ସାର ଦେଇ ମାଟି ଟେକି ଦେବା ଉଚିତ ।

ଗଛ ୧୨ ଦିନର ହେଲେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ସକାଶେ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କ୍ୟାପଟାନ୍ ଗୋଳାଇ ଗଛ ମୂଳ ମାଟିକୁ ଥରେ ଡ଼ା କରିଦେବା ଉଚିତ । ବାଇଗଣ ତଳି ୨୫ରୁ ୩୦ ଦିନରେ, ଲଙ୍କା ତଳି ୩୦-୪୦ ଦିନରେ ଓ କୋକି ତଳି ୨୦-୨୫ ଦିନରେ



ଜମିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ତଳିକୁ ବୁଢ଼ା ନକରି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ କିଆରିରେ ରୋଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ତଳି ପୋତିବା :

ପତ୍ତିର ମାଟି ଯଦି ଶୁଖିଲା ଥାଏ ତେବେ ତଳି ପୋତିବା ପୂର୍ବ ଦିନ ସେଥିରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ଉଚିତ । ତା'ଛଡ଼ା ସେହିଦିନ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ ପୁରାତନ ଦାନା, ୩ ଗ୍ରାମ କ୍ୟାପଟାନ୍ ଓ ୧ ଗ୍ରାମ ପ୍ଲ୍ୟୋମାଇସିନ୍ ମିଶାଇ ଏହି ଦ୍ରବଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛମୂଳକୁ ଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ । ଏହି ଦ୍ରବଣ ତେଜ ଦେଇ ଗଛ ଭିତରକୁ ଯିବ ଓ ଗଛକୁ ବିଷାକ୍ତ କରି ୧୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋକ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ । ଫଳରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ହଠାତ୍ ସେଥିରେ ପୋକ ରୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ ।

ତଳି ପୋତିବା ପରେ ଯଦୂର ସହିତ ନେଇ ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ନେଇ ଜମିରେ ଲଗାଇଦେବା ଉଚିତ । ଅତି ଟାଣ ଖରା ସମୟରେ ତଳି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସାଧାରଣତଃ ଅପରାହ୍ନରେ ତଳି ଲଗାଇବା ଭଲ । ଏହା କଲେ ରାତିରେ ଅଣ୍ଡା ପାଇ ଗଛ ସତେଜ ରହେ ଓ ଏହା ତେଜ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତଳି ରୋଇବା ପରେ ଚାଉଳଗଛ ମୂଳରେ ଅଳ୍ପ ପାଣିଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ତେଜଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ତଳି ବା ଚାଉ ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକମାନଙ୍କ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ :


ଆଜିକାଲି ସହର, ଗ୍ରାମ ସବୁଠାରେ ଚାଉଗଛର ଚାହିଦା ବଢି ଚାଲିଛି । ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କିସମରେ ତଳି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଦରକାର ମୁତାବକ ପରିମାଣରେ ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ସେହି ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନକରି ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୋଜିତ କଲେ ଭଲ ଦି' ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ । ପରିପରିବା ଚାଉ ଛଡା, ଫୁଲ ଚାଉ, ସାମାଜିକ ବନାକରଣ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ଚାଉ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣାରୋ ଉତ୍ପାଦନ କରିହେବ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜର ସୁବିଧା କମି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଲିଙ୍ଗ ସୂତ୍ରରେ ନେଇ ତଳି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ।



ବିଭିନ୍ନ ପରିପରିବା ଲଗାଇବା ସମୟ

ପରିପରିବା ନାମ	ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା ଓ ଚାଉ ଉତାରିବା ସମୟ	ଏକର ପ୍ରତି ମଞ୍ଜିର ପରିମାଣ
ଟମାଟୋ	ମେ-ଜୁନ, ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ	୨୦୦ରୁ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ

ବାଇଗଣ	ମେ-ଜୁନ, ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ	୨୦୦ରୁ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ
ଲଙ୍କା	ଜୁନ-ଜୁଲାଇ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର, ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ	୧୬୦ ଗ୍ରାମ
ଫୁଲକୋବି	ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏ ତଳି ପକାଇ ୨୫ରୁ ୩୦ ଦିନର ଚାଉ ଲଗାଇଯାଏ	୨୦୦ ଗ୍ରାମ
ବନ୍ଧାକୋବି	ମେ'ରୁ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	୧୨୦ ଗ୍ରାମ
ଭେଣ୍ଟି	ଫେବୃଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ, ଜୁନ-ଜୁଲାଇ, ଅକ୍ଟୋବର	୬ କି.ଗ୍ରା
କାଙ୍କଡ଼	ମାର୍ଚ୍ଚ-ଏପ୍ରିଲରେ ଚେର କଳମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଲଗାଯାଏ	୨୦୦୦ ଟେର
ପୋଟଳ	ଫେବୃଆରୀ	୬୦୦୦ ଟେର
କଖାରୁ	ଜୁନ-ଜୁଲାଇ, ଫେବୃଆରୀ	୨ କି.ଗ୍ରା
ଲାଉ, ଜହ୍ନି, କଲରା	ଜୁନ-ଜୁଲାଇ ମାସ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ । ବର୍ଷସାରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାରେ	୮୦୦ ଗ୍ରାମ



ଶିମ୍ବ	ଜୁନରୁ ଅଗଷ୍ଟ (ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଲଗାଇବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ)	୪ କି.ଗ୍ରା
ମୂଳା	ଜୁନ-ଜୁଲାଇ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର ପାଣିର ସୁବିଧା ଥିଲେ ବର୍ଷସାରା ଲଗାଯାଇପାରେ	୪ ରୁ ୫ କି.ଗ୍ରା
ଝୁଙ୍ଗ	ଜୁନ-ଜୁଲାଇ	୫ କି.ଗ୍ରା
ଗୁଆଁର	ଜୁନ-ଜୁଲାଇ	୩ କି.ଗ୍ରା
କୋଶଳା	ନଭେମ୍ବରରୁ ଏପ୍ରିଲ	୩-୪ କି.ଗ୍ରା
ଖଡ଼ା(ଧଳା)	ଏପ୍ରିଲ-ମେ'	୩-୪ କି.ଗ୍ରା
ଖଡ଼ା (ଲାଲ)	ଅକ୍ଟୋବର-ଡିସେମ୍ବର	୩-୪ କି.ଗ୍ରା
ଲେଉଟିଆ	ମାର୍ଚ୍ଚ- ଏପ୍ରିଲ	୩-୪ କି.ଗ୍ରା
ମେଥୁ	ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର	୧୦-୧୨ କି.ଗ୍ରା
ଧଡ଼ିଆ	ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ନଭେମ୍ବର	୮-୧୦ କି.ଗ୍ରା
ଆଲୁ	ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର	୨୦୦ ରୁ ୨୦୦ କି.ଗ୍ରା
ପିଆଜ	ବର୍ଷାଦିନିଆ ପିଆଜ ଜୁନ ମାସରେ ଶୀତଦିନିଆ ପିଆଜ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଖରାଦିନିଆ ପିଆଜ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ	୩ କି.ଗ୍ରା.
ଅମୃତଭଣ୍ଡା	ମେ ମାସରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଚାଉଟିକୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲଗାଯିବ	୧୦୦୦ ଟା
ସଜନା	ବର୍ଷା ଦିନରେ ଚାଉ ଲଗାଯାଇପାରିବ ୪୦ଟା ଗଛ	
କଦଳୀ	ଜୁନ ମାସ ଉତ୍କଳ, ବର୍ଷ ସାରା ଲଗାଯାଇପାରିବ	୧୦୦୦ ଟା
ରସୁଣ	ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର	୨୦-୨୦ କି.ଗ୍ରା