

କଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ କଳସେବନ

ବର୍ଷାଦିନେ ମୁରାବିରି ପଦ୍ଧତିରୁ କଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ଦରକାର । ଗଛ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ପାଣି କଳି ନରହେ ସେଥିପାଇଁ ପଦ୍ଧତିପାଳନ ନେବା ଦରକାର । ବର୍ଷାଦିନେ ମୁରାବିରି ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ଷା ଇସରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଲେ କଳ ସେବନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ । ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନେ କୃଷି ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ଫୁଲ ଧରିବା ସମୟରେ ଥରେ କଳ ସେବନ କଲେ ଭଲ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ଧାନ ଅମଳ ପରେ ମାଟିରେ ସବୁ ବତରକୁ ଇସପୋଷ କରି ମୁରାବିରି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ଯଦି କଳ ସେବନର ବୁଦ୍ଧି ଆସି ତେବେ ଉଦି ରତ୍ନରେ ଗଛର ଫଳ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ଥରେ ଲଘୁ କଳ ସେବନ କଲେ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅତିକମ୍ରେ ତିନୋଟି କଳସେବନ ଯଥା (ବିହନ ବୁଣିବାର ୨୦-୨୫ ଦିନ ପରେ), ଫୁଲ ଧରିବା ସମୟରେ (ବିହନ ବୁଣିବାର ୩୦-୪୦ଦିନ ମଧ୍ୟରେ) ଓ ଫଳ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣ

ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ

ଧଳା ମାଛି- ସାହେବୀ ରୋଗ ଭୂତାଣୁର ବାହକ ଅଟେ । ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଳମେଥୋଲ୍ ୩୦୦.ସି. କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ସାକୋପର୍ ୪୦୦.ସି. ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ମି.ଲି. ହିସାବରେ ଗୋଳାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

କଇଁସୋକ - କଇଁସୋକ ଗଛର କର୍ମିକ ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, କଢ଼ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଉପ ଶୋଷଣ କରି ଖାଇଥାଆନ୍ତି । ଆହୁତ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ନିରସିଆ ଦେଖାଯିବା ସହ ଅଧିକ ଆହୁତ ହେଲେ ଗଛ ଝାଡ଼ିକି ପଡ଼ି ମରିଯାଇଥାଏ । ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମିଥାକ୍ସାଲ ଡିମୋଟର୍ ୨୫୦.ସି. ବା ତାଳମେଥୋଲ୍ ୩୦୦.ସି. ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ମି.ଲି. ହିସାବରେ ଗୋଳାଇ ଫସଲରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ପତ୍ରହୁଆ ଓ ଛୁଇଁ ଚିହ୍ନା ପୋକ - ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରୋପେନୋପର୍ ୫୦୦.ସି. ବା କୁରନାଲ୍ ୨୫୦.ସି.କୁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ମି.ଲି. ହିସାବରେ ଗୋଳାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଇକ୍ସୁରି ପୋକ (ଥୁପସ୍) - ଏମାନେ ମୁରାବିରି ଫସଲର ଫୁଲକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆହୁତ କରିଥାନ୍ତି । ଆହୁତ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ିଯାଏ ।

କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫସଲରୁ କୌଣସି ଦାନା ମିଳିନଥାଏ । ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଫସଲରେ ତାଳମେଥୋଲ୍ ୩୦୦.ସି., କୁରନାଲ୍ ୨୫୦.ସି. ଓ ପୋସାଲୋଲ୍ ୩୫୦.ସି. ଆଦି ଔଷଧକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନେଇ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ଗୋଳାଇ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ।

ରୋଗ

ଚେର ସଢ଼ା ରୋଗ - ବିଶୋଧନ କରି ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଚେରସଢ଼ା ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମେଟାଲାଇକ୍ ଓ ମାନକୋଜେବ୍ ମିଶ୍ରଣରୁ ୨ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧କି.ଗ୍ରାମ୍ ୫୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ଜମିରେ ଠିଆ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ପତ୍ରବାଗ ରୋଗ - ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ମାନକୋଜେବ୍ ୧.୫କି.ଗ୍ରା. କିମ୍ବା ୧କି.ଗ୍ରା. କ୍ୟୁମାନ୍-ଏଲକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଝାଉଁଳା ରୋଗ - ବିଶୋଧନ କରି ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦୦ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ପେଥାଟମ୍ ୫୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ - ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ସଲଫର୍ ସେଡିଟ ଗୁଣ୍ଡ ୫୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ସାହେବୀ ରୋଗ - ରୋଗ ଆରମ୍ଭରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ଏହାର ବାହାକ ଧଳା ମାଛି କୀଟକୁ ଦମନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅମଳ

ମୁରାବିରି ପାକଳ ହେଲେ ଫଳ ପ୍ରାୟତଃ କଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ । ଛୁଇଁ ପାକଳ ହୋଇଗଲେ ଗଛରୁ ତୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୮୦-୯୦ ରାଗ ଛୁଇଁ ଗଛରେ ପାକଳ ହୋଇଗଲେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ଗଛ ବା ଛୁଇଁ ଶୁଖିଲା ପରେ ବାଡ଼େଇ କରି ଅମଳ କରନ୍ତୁ । ଖଜାରେ ଗୋଟିଏ କିସମର ମୁରାବିରି ରଖିବା ଦରକାର । ଅମଳ ପରେ ବିହନକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ, ଯେପରିଆ ଆର୍ଦ୍ରତା ୯% କମିବ । ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୯-୧୦ କିଞ୍ଚାଲ୍ ମୁଗ ଓ ୧୦-୧୨ କିଞ୍ଚାଲ୍ ବିରି ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ।

ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ
କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ବୌଦ୍ଧ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୦୩

ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିରି ଓ ମୁଗ ଚାଷ

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ

ଡଃ ସୁତନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ
ସମ୍ବିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ
ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଶସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ)

ସମ୍ପାଦନା

ଡଃ ସୁତନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ବୌଦ୍ଧ, ଓଡ଼ିଶା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୦୩

ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ

ଡାଲି କେବଳ ଆବାହନ କାଳରୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ । ଡାଲି ଶସ୍ୟରେ ୨୦ରୁ ୩୨ ପ୍ରତିଶତ ପୃଷ୍ଠିସ୍ତର ରହିଥିବାରୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଆମ ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟିରେ ଅଭାବ ଥିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆମିନୋ ଆମ୍ଳର ଚାହିଦା ଡାଲି ପୂରଣ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ସହ ଡାଲି ମିଶାଇ ଖାଇବା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଅଟେ । ଏହା ସହ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚେରର ରୁଟିକାରେ ଥିବା ସହଜାଦା ରାଇକୋବିୟମ୍ ଜୀବାଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୀନକୁ ମାଟିରେ ବିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଆମ ଦେଶରେ ବୁଟ, ହରଡ଼, ମୁଗ, ବିରି, ମସୁର, ମଟର, ଖେସାରି, ରାଜମା ଓ କୋଳଥ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ଼, କୋଳଥ ଓ ଖେସାରି ।

ବିହନ କିସମ

ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ମୁଗ, ବିରିର କେତେକ ବିଜ୍ଞାପିତ କିସମ ବିହନର ତଥ୍ୟାବଳୀ ସାରେଣୀ-୧ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଜମିକୁ ୨/୩ ଓଡ଼ ଚାଷ କରି, ମଜମାରି ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସମତୁଲ କରନ୍ତୁ । ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ହେକ୍ଟରରୁ ୫ଟନ୍ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟ ଓ ବିହନ ହାର

ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟ ଉଦି ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଜୁଲାଇ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ନଭେମ୍ବର ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବୁଣି ବୁଣି ସରିବା ଉଚିତ୍ । ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ବିହନକୁ ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣିବା ଉଚିତ୍ । ଫସଲକୁ ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣିଲେ ହେକ୍ଟରକୁ ୨୫କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଧାଡ଼ିରେ ବିହନ ବୁଣିଲେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ରୁହେ ଏବଂ ଅନ୍ଧ ଚାଷ ଓ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହଜରେ କରିହୁଏ । ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଦାଡ଼ି ୩୦ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ଓ ଶୀତ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ୨୫ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ତଥା ମାଟ୍ରି ୧୦ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଣିବା ଉଚିତ୍ । ବିହନ ବୁଣି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଯେପରି ଯେଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିହନ ନଥାଏ ।

ସାରେଣୀ-୧: ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ମୁଗ ଓ ବିରି କିସମ

କ୍ର.ସଂ.	କିସମ	ବୁଣିବା ସମୟ (ଋତୁ)	ଅଦଧି (ଦିନ)	ଅମଳ ସମୟ (କିଞ୍ଚାଲ୍/ହେକ୍ଟର)
---------	------	---------------------	---------------	------------------------------

(କ) ମୁଗ କିସମ

୧	ଧରଣି	ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟତଃ, ଋତୁ	୬୦-୭୦	୭.୦
୨	କାମଦେବୀ(ଓ.ଡି.ଏ. ୧୩୯)	ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟତଃ, ଋତୁ	୫୫-୬୦	୮.୦
୩	ଓ.ଡି.ସି. ୫୨	ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟତଃ, ଋତୁ	୬୦-୬୫	୮.୦
୪	ଡି.ଏ.ଆର୍.ଏମ୍.୧	ପ୍ରାୟତଃ, ଋତୁ	୬୫-୭୦	୮.୦
୫	ଡି.ଏ.ଆର୍.ଏମ୍.୧	ପ୍ରାୟତଃ, ଋତୁ	୬୦-୬୫	୮.୦
୬	ସମ୍ରାଟ (ଓ.ଡି.ଏ. ୧୧୫)	ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟତଃ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ	୬୦-୬୫	୮.୫
୭	ପୁଷ୍ପ ବିଶାଳ	ବର୍ଷା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ	୬୦-୬୫	୮.୫
୮	ପୁଷ୍ପ ୯୦୭୨	ପ୍ରାୟତଃ, ଋତୁ	୬୫-୭୦	୮.୫
୯	ଏଲ୍.ସି.ସି. ୪୧୦	ଋତୁ	୬୫-୭୦	୭.୦
୧୦	ଏଲ୍.ସି.ସି. ୪୬୦	ପ୍ରାୟତଃ, ଋତୁ	୬୫-୭୦	୭.୫
୧୧	ଏସ୍.ଏମ୍.ଏଲ୍. ୬୬୮	ଗ୍ରୀଷ୍ମ	୬୦-୬୫	୮.୦
୧୨	ଆଇ.ପି.ଏମ୍.୦୨-୩	ବର୍ଷା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ	୬୦-୬୫	୯.୦
୧୩	ଆଇ.ପି.ଏମ୍.୦୨-୧୪	ବର୍ଷା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ	୬୫-୭୦	୭.୫

(ଖ) ବିରି କିସମ

୧	ସରଳା	ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟତଃ, ଋତୁ	୬୦-୬୫	୮.୦
୨	ପ୍ରସାଦା (ବି.ମା-୮-୮)	ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟତଃ, ଋତୁ	୬୫-୭୦	୧୦.୦
୩	ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା (ଓ.ଡି.ସି. ୧୭)	ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟତଃ, ଋତୁ	୬୫-୭୦	୯.୦
୪	ମାହୁରି (ଓ.ଡି.ସି. ୩୧)	ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟତଃ, ଋତୁ	୬୫-୭୦	୮.୦
୫	ପି.ୟୁ. ୧୯	ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟତଃ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ	୬୦-୮୦	୮.୦
୬	ପି.ୟୁ. ୩୦	ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟତଃ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ	୬୦-୮୦	୮.୫
୭	ପି.ୟୁ. ୩୫	ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟତଃ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ	୬୦-୮୦	୮.୫
୮	ପି.ୟୁ. ୯୪-୨	ଋତୁ	୬୦-୮୦	୯.୦
୯	ପି.ୟୁ. ୩୧	ବର୍ଷା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ	୬୦-୮୦	୯.୦
୧୦	ଏଲ୍.ସି.ସି. ୧୭	ଋତୁ	୬୦-୮୦	୯.୦
୧୧	ଆଇ.ପି.ୟୁ.୦୨-୪୩	ବର୍ଷା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ	୬୦-୮୦	୧୦.୦

ବିହନ ବିଶୋଧନ ଓ ଜୀବାଣୁ ସାରିବା ପ୍ରୟୋଗ

ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ୧କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଚି ପ୍ରତି ୩ଗ୍ରାମ୍ ଥିଆମିନ କିମ୍ବା ୨ଗ୍ରାମ୍ ବାରିଷ୍ଟର୍ ଗୋଳାଇ ବିଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାପରେ ପତ୍ର ଚାଷ, ଆର୍ଦ୍ରତା, ଚାଷ ଗଛ ପରିସିଦ୍ଧା ରୋଗ ଦାଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ । ବିହନ ବିଶୋଧନ ପରେ ୨୦୦ଗ୍ରାମ୍ ଗାଇକୋବିୟମ୍ ଜୀବାଣୁ ସାରି ଓ ୨୦୦ଗ୍ରାମ୍ ଫସ୍‌ଫେଟ୍ ଡ୍ରବ୍‌ଶାକାରୀ ଜୀବାଣୁ ସାରିକୁ ୮୦୦ ମିଲିଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ୧୦କିଲୋ ମଞ୍ଚିରେ ଗୋଳାଇ ପରିସିଦ୍ଧା ଚଟାଣ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ ବେଗ୍ ଉପରେ ଛାଲିରେ ଶୁଖାଇ ଜମିରେ ବୁଣିବା ଦରକାର ।

ଖତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ

ଏକ ହେକ୍ଟର ମୁଗ/ବିରି ଚାଷ ପାଇଁ ୨୦କି.ଗ୍ରା. ଯନ୍ତ୍ରଣାକୀନ, ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସ୍‌ଫେଟ୍ ଏବଂ ୨୦କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ସାର ଆବଶ୍ୟକ । ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତାୟ ଫସ୍‌ଫେଟ୍, ପଟାସ୍ ଓ ଅଧା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୀନ ସିଆରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଞ୍ଚି ବୁଣିବା ଦରକାର । ସାର ଯେପରି ମଞ୍ଚିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସିଆରରେ ସାର ପକାଇ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା ପରେ ମଞ୍ଚି ବୁଣିବା ଦରକାର । ଫସଲକୁ ୨୧ଦିନ ହେଲେ କୋଡ଼ା, ଖୋସା ସାରି ଓ ଘାସ ଚାଆ ଅନାବନା ଗଛ ବାଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୀନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମୂଳ ସାର ସହ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୦କି.ଗ୍ରା. ଗନ୍ଧକ (୧୦୦କି.ଗ୍ରା. କିସମ) ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅମଳ ଶତକଡ଼ା ୧୦% ବଢ଼େ । ଅନୁମୋଦିତ ଅନୁମୋଦିତ ଫସ୍‌ଫେଟ୍ ସାର ସିଙ୍ଗଲ୍ ସୁପର୍ ଫସ୍‌ଫେଟ୍ ଆକାରରେ ବେଳେ ସେଥିରେ ଥିବା ଗନ୍ଧକ ଫସଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ । ବିରୁ ଡି.ଏ.ସି. ଭରରେ ଗନ୍ଧକ ନଥିବାରୁ ଡି.ଏ.ସି. ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ।

ଅନ୍ଧାଚାଷ ଓ ଘାସ ବନାନ

ମୁଗ/ବିରି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଚିନି ସପ୍ତାହର ହୋଇଗଲେ, କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ଅନାବନା ଗଛ ଓ ଘାସ ବାଛି ଦେବା ଦରକାର । ଚା'ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୀନ ସାର ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବୁଟା ଚୋରି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗଛ ୩୦-୩୫ ଦିନ ହୋଇଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଘାସ ବାଛିବା ଦରକାର । ବୃକ୍ଷନାସକ ବା ଘାସମତା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ କରାଯାଇପାରିବ । ସେଥିପାଇଁ ମଞ୍ଚି ବୁଣିବାର ୨୫ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨.୫କିଗ୍ରା. ଡେଫୋଥାଲିନ୍ (୩୦କି.ସି) ୫୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ଛା'ରେ ଝିନ ବେଳେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ ।