

ଫାଇଲ ଫାଇଲ:

ପୋକ:

୧. ଭଲ ଓ ଧବଳ କୁଳା: ଉପତୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦କି.ଗ୍ରା. କ୍ଲୋରପାଲରିଫସ୍ ୧.୫% ଗୁଣ୍ଠ କିମ୍ବା କାର୍ବୋଫୁରାନ୍ ୩% କି. ୧୩ କି.ଗ୍ରା. କିମ୍ବା ଫେରେନ୍ ୧୦% ସି.ଜି. ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
୨. ପତ୍ର ସୁତଳା ପୋକ: ତେଲଟାମେଥ୍ରିନ୍ ୨.୮% ଇ.ସି. ୩୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡା ପାଲହାଲୋଥ୍ରିନ୍ ୫% ଇ.ସି. ୧୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଡିମେଟନ୍ ମିଥାଇଲ୍ ୨୫% ଇ.ସି. ୪୦୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
୩. କଳପୋକ: ଲମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ୍. ୫୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଡିମେଟନ୍ ମିଥାଇଲ୍ ୨୫% ଇ.ସି. ୪୦୦ ମି.ଲି., ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
୪. ପତ୍ରତୀର୍ଥୀ ପୋକ ଓ ଉକୁଣିଆ ପୋକ: ଲମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ୍. ୫୦ମି.ଲି. କିମ୍ବା କ୍ଲୋରପାଲରିଫସ୍ ୨୦% ଇ.ସି. ୪୦୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
୫. ନାଲି ସଂବାକୁଆ: ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କି.ଗ୍ରା. କ୍ଲୋରପାଲରିଫସ୍ ୧.୫% ଗୁଣ୍ଠ ବିଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
୬. ଧୂଆଁପତ୍ର ଗୋଟି ପୋକ ଓ ବୃଟ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ: ପ୍ରୋପେନୋଫସ୍ ୫୦% ଇ.ସି. ୪୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଡିନୋସାଲ୍ ୪୫% ଏସ୍.ସି. ୮୦ ମି.ଲି., ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ରୋଗ:

୧. ଟାକା ରୋଗ: କ୍ଲୋରୋଥାଲୋନିଲ୍ ୬୫% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ୩୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ହେକ୍ସାକୋନାଜେଲ ୫% ଇ.ସି. ୬୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ପାଲରୋକ୍ଲୋଷ୍ଟାବିନ୍ ୨୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଇପୋକ୍ସିକୋନାଜେଲ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ୩୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
୨. ଗଜାସଡ଼ା, ବେକ ସଡ଼ା, କାଷ୍ଠ ସଡ଼ା ରୋଗ: ଥିରାମ୍ ୬୫% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ୬୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୫୦ % ଡବ୍ଲୁ.ପି. ୧କି.ଗ୍ରା. କିମ୍ବା କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୨୫%+ମାନକୋଜେବ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ମୂଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
୩. କଳଙ୍କି ରୋଗ: କିଟରଟାନଲ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ୪୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ୪୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ମାନକୋଜେବ୍ ୬୫% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ୮୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଅମଳ: ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ତିନାବାଦାମ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ମଡାଇ ଅମଳ ଅଳ୍ପ ତେରିରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପାଦିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ତିନାବାଦାମ ଗଛ ଉପାଦିବା ପରେ ଭେଜା ବାନ୍ଧି ଫଳ ଉପର ଓ ତାଳ ଚଳକୁ କରି ଛାଇରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ଭେଜା ବା ବିଡାରେ ବାଦାମ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଫଳକୁ ଗଛରୁ ତୋଳି ଛାଇରେ ଖେଳାଇ ଶୁଖାଇବା ଦରକାର । ମଞ୍ଚି ଭଲରେ ଶୁଖିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫଳକୁ ହାତରେ ଧରି ହଲାଇଲେ ଝଣ ଝଣ ଶୁଭିବା ଦରକାର । ଛଡା ମଞ୍ଚିକୁ ଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁଳରେ ଦବାଇଲେ ଏହା ସହଜରେ ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଯାଏ । ଅମଳ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ମଞ୍ଚିରେ ୫୫% ରୁ ୬୦% ଜଳାୟ ଅଂଶ ଥାଏ । ତେଣୁ ଜଳାୟ ଅଂଶ ୧୦% ରୁ କମ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଶୁଖାଇବା ଦରକାର । ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାଷ ଜଳେ ଖରାଟିଆ ତିନାବାଦାମରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦-୧୨ କିଂଘାଲ ଓ ବର୍ଷା ଋତୁ ଫସଲରୁ ୬-୮ କିଂଘାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ ।

ତିନାବାଦାମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳବାଳ ଜାତୀୟ ଫସଲ । ତିନାବାଦାମରେ ସାଧାରଣତଃ ୪୮-୫୦% ତେଲ, ୨୬-୨୮% ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଏହାଛଡା ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ତନ୍ତୁ, ଖଣିଜଲବଣ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ମହକୁଦ୍ ଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ୪ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ତିନାବାଦାମ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅମଳ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ତିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଟ. ୧୨,୦୦୦- ଟ. ୧୬,୦୦୦ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନଥାନ୍ତି । ଖରିଫ୍ ଫସଲରୁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ହାରାହାରି ୧୦-୧୨ କିଂଘାଲ ଅମଳ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ରବି ଓ ଖରାଟିଆ ଫସଲରୁ ୧୫-୨୦ କିଂଘାଲ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ଏଣୁ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉନ୍ନତ ବିହନ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଫସଲ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡେ ।

ମୃତ୍ତିକା: ତିନାବାଦାମ ଫଳ ମାଟି ତଳେ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ମାଟି ଭିତରେ ପାକଳ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଠକରି ହାଲୁକା କରିବା ଓ ଗହିରିା ଚାଷ କରିବା ଦରକାର କରିଥାଏ । ନିଗିଡା, ବାଲିଆ, ଦୋରସା ଓ ପତ୍ର ମାଟିରେ ତିନାବାଦାମ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କାଦୁଆ ତିଳିଡା ଓ ଲୁଣ ମାଟିରେ ଚାଷ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ତିନାବାଦାମ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା. ଜିପ୍ସପମ୍ ପକାଇ ମାଟିରେ ମିଶାଇବା ଦରକାର ।

ବୁଣିବା ସମୟ: କୁନ୍ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହଠାରୁ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଖରିଫ୍ ତିନାବାଦାମକୁ ବୁଣିଦେବା ଉଚିତ୍ । ସେହିପରି ରବି ତିନାବାଦାମକୁ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବୁଣିଦେଲେ ଅମଳ ଭଲ ମିଳିଥାଏ ।

ବିହନ:

କିଷମ	ଅମଳ ଅବଧି (ଦିନ)		ବିଶେଷ ଗୁଣ
	ଖରିଫ୍	ରବି	
ଧରଣୀ	୧୦୫	୧୧୦	ଗୁଛ ଆକୃତି, ମରୁଡି ସହଣୀ
ଟିଜି-୩୮	୧୨୦	୧୩୦	ଗୁଛ ଆକୃତି, ଅଗ୍ରମୁକୁଳ ପୋଡା ସହଣୀ
ଜିପିବିଡି-୪	୧୦୫	୧୨୦	ଗୁଛ ଆକୃତି, ଟୀକାରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ
ସ୍ୱତି	୯୫	୧୩୦	ଗୁଛ ଆକୃତି, ନାଲିମଞ୍ଜି, ଗଳାପଚାରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧି ।
ଟିଏଜି-୨୪	୯୦	୧୦୦	ଗୁଛ ଆକୃତି ମୁକୁଳପୋଡା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧି
ଟି.ଜି.-୩	୧୦୦	୧୨୫	ଗୁଛ ଆକୃତି, ମରୁଡି ସହନଶୀଳ
ଟି.ଏମ୍.ଭି-୨	୧୦୫	୧୧୫	ଅର୍ଦ୍ଧଲୋଟଶୀ, ମରୁଡି ସହନଶୀଳ
ଆଇ.ସି.ଜି.ଏମ୍-୪୪	୧୧୦	୧୨୫	ଅର୍ଦ୍ଧଲୋଟଶୀ, ମୁକୁଳ ପୋଡାରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧି
ଆଇ.ସି.ଜି.ଏମ୍-୧୧	୧୧୦	୧୧୫	ଗୁଛ ଆକୃତି, ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ
ଆଇ.ସି.ଜି.ଭି. ୯୧୧୧୪ (ଦେବୀ)	୯୦	୯୫	ଥ୍ରିଫ୍ସ ସହଣୀ କିଷମ ଓ ସହଜ ଅମଳ ମିଳେ
ଟି.ଜି.୩୮ଡି	୯୫	୧୧୫	ମୁକୁଳ ପୋଡା ରୋଗ ସହଣୀ

ତିନାବାଦାମ



ବିଷୟ ବସ୍ତୁ

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚପନ କୁମାର ଦାସ, ସବୁିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ, (ଶିକ୍ଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ)

ସମ୍ପାଦକ

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚପନ କୁମାର ଦାସ

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ବୌଦ୍ଧ, ଓଡ଼ିଶା

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୦୩

ବିହନ ପରିମାଣ: ବର୍ଷା ଋତୁପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦କି.ଗ୍ରା. ଚୋପାଛଡା ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରବି ଋତୁପାଇଁ ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।

ବିହନ ନିର୍ବାଚନ : ଚାନାବାଦାମ ଚାଷରେ ହେଉଥିବା ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଶତକଡା ୩୦ ରୁ ୩୬ ଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କେବଳ ବିହନରେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଭଲ ଦାନା ଥିବା ପାକଳ ମଞ୍ଜି ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର । ୩-୫ ସେ.ମି. ଗଭୀର ମାଟିତଳେ ବୁଣିଲେ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ବିହନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଞ୍ଜିର ଚୋପାକୁ ହାତରେ ଛଡାଇଲେ ଭଲ ।

ବିହନ ବିଶୋଧନ: ବିଭିନ୍ନ ଫିମି ଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷାପାଇବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜିକୁ ଲଗାଇବାର ୬ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ । ୧ କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ପାଇଁ ୩ ଗ୍ରାମ୍ ଥିରାମ୍ ବା ୨ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ବା ୨.୫ କାର୍ବୋକ୍ସିନ୍ ୩୬.୫%+ଥିରାମ୍ ୩୬.୫% ଡି.ଏସ୍. ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ।

କଲଚର ଦ୍ୱାରା ବିହନ ଉପଚାର: ରାଇଜୋବିୟମ୍ କଲଚର ଓ ପି.ଏସ୍.ଏମ୍ କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁ କଲଚର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ବୁଣିବାର ୧ ସପ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ୧ କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଚିରେ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଓ ୧୫ ଗ୍ରାମ୍ ପି.ଏସ୍.ଏମ୍.କୁ ମିଶାଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ୧ କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଚିରେ ୪ ଗ୍ରାମ୍ ଟ୍ରାଇକୋଟର୍ମା ଭିରିହେ କଲଚରକୁ ମିଶାଇଲେ ଏହା କାଷ୍ଠସଡ଼ା ଓ ବେଳସଡ଼ା ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ।

ବୁଣିବା ପ୍ରଣାଳୀ: ଖରିଫ୍/ ବର୍ଷାଋତୁ - ଧାତିକୁ ଧାତି ୩୦ ସେ.ମି. ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦ ସେ.ମି. । ରବି ଋତୁ - ଧାତିକୁ ଧାତି ୨୦ସେ.ମି., ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦ ସେ.ମି. ।

ଫସଲ ସମୟ: ଏକର ପ୍ରତି ୨-୩ ଟନ୍ ସଡ଼ା ଗୋବର ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ଏହା ସହିତ ଏକର ପ୍ରତି ୮ କି.ଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୧୬ କି.ଗ୍ରା ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ୧୬ କି.ଗ୍ରା ଫଟାସ୍ ସାରରୁ ବୁଣିବା ସମୟରେ ମୂଳସାର ହିସାବରେ ଦେବା ଦରକାର । ସମସ୍ତ ସାରକୁ ମିଶାଇ ୫ ସେ.ମି. ଗଭୀରରେ ସିଆରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ବିହନ ବୁଣିବା ଉଚିତ । ତିନାବାଦାମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ସଲଫରର ଅଭାବ ପରିଲିକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଏଣୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା. ଜିପ୍ସପମ୍କୁ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ । କାରଣ ଜିପ୍ସପମ୍ରେ ଶତକଡା ୨୨.୩ ଭାଗ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ୧୮.୬ ଭାଗ ସଲଫର୍ ଅଛି । କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ତିନାବାଦାମ ଫମ୍ପା ନ ହେବାରେ ଓ ସଲଫର ତେଲ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଅନ୍ତଃ ଚାଷ: ଗଛ ଉଠିବାର ୫-୬ ଦିନ ବେଳକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଗଛ ନ ଉଠିଥାଏ, ସେଠାରେ ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ । ଗଜା ହେବାର ୨-୩ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ମାଟି ଖୁସାଇ ଘାସ ବାଛ ଗଛ ମୂଳରେ ୧୦ ସେ.ମି. ମାଟି ଟେକିଦେଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ଏହାଫଳରେ ମାଟି ହାଲୁକା ରହେ ଓ ଓହଳ ଭଲଭାବରେ ମାଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । ଏକର ପ୍ରତି ୮୦-୧୦୦ ମି.ଲି. ଅକ୍ସିପ୍ଲୋରଫେନ୍ ୨୩.୫% ଇ.ସି. କିମ୍ବା ୧୩୩୦ ମି.ଲି. ପେଣ୍ଡିମେଥାଲିନ୍ ୩୦% ଇ.ସି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଲଗାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଟିରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଇମାଜିଥାପିର୍ ୧୦% ଏସ୍.ଏଲ୍ ୬୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଦ୍ୱିକାଲିଫସ୍ ଇଥାଇଲ୍ ୫% ଇ.ସି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ହୁଏ ।

ଜଳସେଚନ: ଗଛ ଉଠିବାର ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ପରେ ଥରେ ହାଲୁକା ଭାବେ ପାଣି ମଡାଇବା ଉଚିତ । ଫୁଲ ଫୁଟିବା, ଫଳ ବଢ଼ିବା, ଓହଳ ହୋଇ ମାଟିରେ ପଶିବା ସମୟରେ ମାଟିରେ ଜଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କେବେହେଲେ ଜମିରେ ଅଧିକ ପାଣି ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସାଧାରଣତଃ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ୫୦ ରୁ ୬୦ ଦିନରେ ଜମି ୮-୧୦ ସେ.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଦା ରହିବା ଦରକାର । ଏହାଦ୍ୱାରା ଚେର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସାରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଫଳ ଓ ମଞ୍ଜି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ ।