

ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବିହନ ବୁଣିବାର ୧୫-୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଜଳସେଚନ : ବର୍ଷାଦିନେ ହରଡ଼ ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ । ଫୁଲ ଧରିବା ସମୟରେ ଯଦି ବର୍ଷା ନହୁଏ । ତାହାହେଲେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ଦରକାର । ଜଳସେଚନ ଦେବାର ସଙ୍କଟକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଫୁଲ ଧରିବା ଓ ଛୁଇଁରେ ଦାନା ପୁରଣ ଅବସ୍ଥା ।

ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣ :

ପୋକ :

୧. **ଜଉପୋକ :** ପତ୍ରରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଇବା ଫଳରେ ଗଛ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ । ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ମି.ଲି. ଡାଇମିଥୋଏଟ୍ ୩୦% ଇ.ସି. ୩୦% ଇ.ସି. ୨୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
୨. **ସଂବାଳୁଆ :** ସଂବାଳୁଆ ପୋକ ଗଛର ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପତ୍ରକୁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ମି.ଲି. କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ ୨୦% ଇ.ସି. ୨୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
୩. **ବାଘୁଆ ପୋକ :** ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପୋକ ଫୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଗନ୍ତି ଓ ଫୁଲ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ମି.ଲି. କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ ୫୦%+ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ ୫% ଇ.ସି. ୨୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
୪. **ଛୁଇଁବିନ୍ଧା ପୋକ :** ଏହି ପୋକ ହରଡ଼ ଛୁଇଁକୁ କଣାକରି ଖାଇଯାଏ । ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସପାଏ । ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦ମି.ଲି. ଇଣ୍ଡକ୍ସାକାର୍ବ ୧୪.୫% ଏସ୍.ସି. ୨୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ରୋଗ :

୧. **ପାଉଁସିଆ ରୋଗ :** ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ଉପରେ ପାଉଁସିଆ ଚିହ୍ନ ହୁଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଏ । ଏକର ପ୍ରତି ୧କି.ଗ୍ରା. ୮୦% ସେଚିଡ ଗନ୍ଧକଗୁଣ୍ଡ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
୨. **ଝାଉଁଳା ରୋଗ :** କିଆରୀରେ ମଳା ମଳା ହୋଇ ଗଛ ଝାଉଁଳି ମରିଯାଏ । ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦%ଡବ୍ଲୁ.ପି. ୨୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ମୂଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି ।

ଅମଳ : କିଆରୀରେ ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଛୁଇଁ ଶୁଖିଗଲେ ଗଛକୁ କିଆରୀରୁ ଆଣି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଯାରିବା ପରେ କାଡ଼େଇ ଅମଳ କରାଯାଏ । ଏକ ଏକର ଜମିରୁ ହାରାହାରି ୮-୧୦ କିଣ୍ଡାଲ ମଞ୍ଜି ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ୨୦-୨୫ କିଣ୍ଡାଲ ଶୁଖିଲା ଗଛ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।

ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳବାୟୁ : ନିରିଡ଼ା ଜିପ ଜମିରେ ହରଡ଼ ଚାଲ ଭଲ ହୁଏ । ଏଥିପାଇଁ ଦୋରସା, ବାଲିଆ ଦୋରସା ଓ ପତୁ ଦୋରସା ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ସତସତ୍ତିଆ ଓ ମଟାଳ ମାଟିରେ ହରଡ଼ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ । ଆମ ରାଜ୍ୟର ବୃତ୍ତାତ୍ମକ ଉଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ।

ବିହନ :

କିସମର ନାମ	ଅମଳ ଅବଧି (ଦିନ)	ବିଶେଷ ଗୁଣ
ଆଇ.ସି.ପି.ଏଲ୍-୮୮୦୩୯	୧୧୦-୧୨୦	ଗଛ ବୁଦ୍ଧାବିଧି, ଫୁଲ ହଳଦିଆ, ଫୁଲର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଥାଏ ।
ଆଇ.ସି.ପି.ଏଲ୍-୧୫୧ (କାବୁଡି)	୧୩୦	ଗଛ ବୁଦ୍ଧାବିଧି, ଫୁଲ ହଳଦିଆ, ଫୁଲର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଥାଏ ।
ଆଇ.ସି.ପି.ଏଲ୍-୮୭୦୯୧	୧୨୧	ଗଛ ବୁଦ୍ଧାବିଧି, ଫୁଲ ହଳଦିଆ, ମଞ୍ଜି ଲହୁଣୀ ରଙ୍ଗର ।
ଆଇ.ସି.ପି.ଏଲ୍-୮୧	୧୩୦	ଗଛ ତେଙ୍ଗା, ଫୁଲ ହଳଦିଆ, ମଞ୍ଜି ଧୂସର ।
ଆଇ.ସି.ପି.ଏଲ୍-୮୮୬୩ (ମାଉଡି)	୧୬୬	ଗଛ ତେଙ୍ଗା, ଫଳ ଧୂସର ।
ଆଇ.ସି.ପି.ଏଲ୍-୮୭୧୧୯ (ଆଶା)	୧୮୦	ଗଛ ତେଙ୍ଗା, ଫୁଲ ହଳଦିଆ ଲାଲ, ମଞ୍ଜି ଧୂସର ।
ଆଇ.ସି.ପି.ଏଲ୍-୮୫୦୬୩ (ଲକ୍ଷ୍ମୀ)	୧୮୨	ଗଛ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର, ଫୁଲ ଧଳା, ମଞ୍ଜି ଧଳା ଲହୁଣୀ ରଙ୍ଗର ।
ଆଇ.ସି.ପି.ଏଲ୍-୨୦୦୯୨	୨୨୦	ଗଛ ବୁଦ୍ଧାବିଧି, ଫୁଲ ଶୁଷ୍କ ହଳଦିଆ ।
ଆଇ.ସି.ପି.ଏଲ୍-୧୩୦୯୨	୨୧୦	ଗଛ ବୁଦ୍ଧାବିଧି, ମଞ୍ଜି ଧଳା ।
ଆର୍-୬୦ (ମୁକ୍ତା)	୧୮୦	ଗଛ ତେଙ୍ଗା, ଫୁଲ ହଳଦିଆ ।

ବୁଣିବା ସମୟ : ହରଡ଼ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବୁଣାଯାଏ । ସଅଳ କିସମ ବିହନ ଶୀତ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଏକକ ଫସଲ ଭାବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବରରେ ବୁଣାଯାଇପାରିବ ।



ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହରଡ଼ ଚାଷ

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ

ଡଃ ସୁତନୁ କୁମାର ଶତପଥୀ
ସମ୍ବିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ
ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଶସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ)

ସମ୍ପାଦନା

ଡଃ ସୁତନୁ କୁମାର ଶତପଥୀ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ବୌଦ୍ଧ, ଓଡ଼ିଶା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୦୩



ବିହନ ପରିମାଣ ଓ ବିଶୋଧନ : ବର୍ଷାଦିନେ ଏକର ପ୍ରତି ସଅଳ ଅମଳ ହେଉଥିବା କିସମକୁ ୮କି.ଗ୍ରା. ବିଲମ୍ବରେ ଅମଳ ହେଉଥିବା କିସମ ପାଇଁ ୬କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଶୀତ ଋତୁରେ ହରଡ଼ ଚାଷ ପାଇଁ ୧୦ ରୁ ୧୨କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ଦରକାର । ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ ବୁଣିବା ଆଗରୁ ୩ଗ୍ରାମ୍ କ୍ୟାପ୍ଟାନ, କିମ୍ବା ଥିରାମ୍ କିମ୍ବା ୧.୫ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ଗୋଟାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

ଜୀବାଣୁ କଲଚର ଉପଚାର : ହରଡ଼ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବାଣୁ କଲଚର ୨୦୦ଗ୍ରାମ୍ ନେଇ ଏକର ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବିହନ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ । ବିହନ ବିଶୋଧନ ଓ ଉପଚାର ମଧ୍ୟରେ ୭ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା ଦରକାର ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିହନ ବୁଣା : ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଲେ ବିହନ ସହଜରେ ଗଜା ହୁଏ । ଏଣୁ ଜମିକୁ ୩/୪ ଓଡ଼ ଚାଷ କରି ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ସମତୁଲ କରନ୍ତୁ । ହରଡ଼ ଧାଡ଼ି ବୁଣାଗଲେ କୋଡ଼ାଖୁସା, ଘାସବଞ୍ଚା ଓ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ସୁବିଧା ହୁଏ ।

କିସମ	ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି (ସେ.ମି.)	ଗଛକୁ ଗଛ (ସେ.ମି.)
ସଅଳ କିସମ	୪୫	୨୦
ବିଲମ୍ବ କିସମ	୬୦	୨୦
ପ୍ରାକ୍ ରବି	୩୦	୧୫

ବିହନକୁ ଧାଡ଼ିରେ ୩ରୁ ୫ସେ.ମି. ଗଭୀରରେ ବୁଣନ୍ତୁ ।

ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ : ହରଡ଼ ଚେର ଗଭୀରକୁ ଯାଏ । ଏହା ସହିତ କମ୍ ଗଭୀର ଚେର ଫସଲ ଭାବେ ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା, ଚିନାବାଦାମ, ମୁଗ ଓ ବିରିକୁ ମିଶାଇ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ । ହରଡ଼+ଧାନ ୨:୫ ଅନୁପାତ । ହରଡ଼+ମାଣ୍ଡିଆ ୨:୪ ଅନୁପାତ । ହରଡ଼+ମକା ୧:୧ ଅନୁପାତ । ହରଡ଼+ଚିନାବାଦାମ ୧:୩ଅନୁପାତ । ହରଡ଼+ମୁଗ/ବିରି ୧:୩ଅନୁପାତ ।

ଖତ ସାର : ଏକର ପ୍ରତି ୨ଟନ୍ ସବ୍ ସୋବର ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକର ପ୍ରତି ୮-୧୨କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୧୬-୨୪କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ୍ ଓ ୮କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ଦରକାର । ଏହାକୁ ମୂଳସାର ହିସାବରେ ଶେଷଓଡ଼ ଚାଷ ବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଅନ୍ତଃଚାଷ : ବିହନ ବୁଣିବା ପରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧ଲିଟର ପେଣ୍ଡିମେଥାଲିନ୍ ୩୦% ଇ.ସି. ୨୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ମାଟି ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ । ଗଛ ଉଠିବାର ୨-୩ସପ୍ତାହ ଓ ୫-୬ସପ୍ତାହ ଏପରି ୨ଥର କୋଡ଼ାଖୁସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଘାସ ହେଲେ କୂଳାଲୋଫ୍ ଲାଆଇଲି ୫% ଇ.ସି. (ଚାରଗାସୁପର) ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ମି.ଲି. ୨୦୦ଲିଟର