

ଧାନ ଫସଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ କିଆରୀରେ ରଖାଯିବାକୁ ଥିବା ଜଳସ୍ତର

ଫସଲର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା	କିଆରୀରେ ଜଳସ୍ତର (ସେ.ମି.)
ରୋଇବା ବେଳେ	୨
ରୋଇବା ପରେ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	୫
ରୋଇବାର ୩ ଦିନ ଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ପିଲହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	୨
ସର୍ବାଧିକ ପିଲହେବା ସମୟରେ (କେବଳ ଉର୍ବର ଜମିରେ)	ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଜମିକୁ ନିରିତା ରଖନ୍ତୁ
ସର୍ବାଧିକ ପିଲହେବା ସମୟ ଠାରୁ ଥୋତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	୨
ଥୋତ ହେବା ଠାରୁ ଫୁଲ ହେବାର ୨୧ ଦିନ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	୫
ଫୁଲ ହେବାର ୨୧ ଦିନ ପରେ	ଜଳସେଚନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

- ବୁଣାଧାନ ପାଇଁ ଘାସ ମଞ୍ଜି ନଥିବା ପ୍ରମାଣକୃତ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

- ରୋଇବାବେଳେ ଘାସ ଗଛ ନଥିବା ନିରୋଇ ଧାନ ଚଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

- ଶୁଷ୍କ ବୁଣାଧାନରେ ଫସଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଶୁକୁ ଆହାଦଭାବେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଘାସ ବଢ଼ି ପାରେ ନାହିଁ ।




- ବୁଣାଧାନରେ ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ଜଳସେଚନ କଲେ ବା ହାତରେ ଘାସ ବାଛିଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘାସ ବଢ଼ି ନଥାଏ ।

- ଭଲ ଭାବେ ସଢ଼ିଥିବା ଗୋବର ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ସଢ଼ି ନଥିବା ଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । (ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘାସ ମଞ୍ଜି ଜମିରେ ପଡ଼ିପାରେ)

ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ

ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନାବନା ଘାସକୁ ଫସଲ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ (୩୦% ଫସଲ ଚଳୁ)



ଫସଲର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା (ଦିନ)

କୃତଜ୍ଞତା

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (IRRI), ଓଡ଼ିଶା

ଓଡ଼ିଶା ହବ୍, ଅର୍ପିସ୍, ପ୍ଲଟ ୩୪୦/ସି, ଶହୀଦନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୦୭

ଟେଲିଫୋନ୍: ୦୬୭୪-୨୫୮୪୯୨୯



ସଂପାଦନା

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତପନ କୁମାର ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ

ବିଷୟବସ୍ତୁ

ଶ୍ରୀମତୀ ସୁସ୍ମିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ମୟୂରା ସିଂ ସରଦାର ଶ୍ରୀମତୀ ହରପ୍ରିୟା ସେଠୀ, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ପରିମାଣିକ

କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟତା: ମ. ସଦାକତ ଆକ୍ଲା

କୃଷିବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ବୌଦ୍ଧ

ପାଲଝର, ସାଲୁକି, ସରସରା, ବୌଦ୍ଧ - ୭୬୨୦୨୬

E-mail: kvkboudh.ouat@gmail.com

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର



ଭୂଆଁ ଧାନରେ ଅନାବନା ଘାସ ପରିଚାଳନା

- ଚଳିପତାକିରେ ଅନାବନା ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ ବିହନ ବୁଣିବାର ୩-୪ ଦିନ ପରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୦.୪୫ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରେଟିଲ୍‌କ୍ଲୋର + ସାଫନର୍ (ଗଜା-ପୂର୍ବ ଘାସମରା ଔଷଧ) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଚଳି ରୋଇବାର ୧୫ ଦିନ ପରେ ପ୍ରତି ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ରୋଟାଟାରା ଡ୍ରିଟର୍ ଚଳାନ୍ତୁ ।
- ଧାନ କିଆରୀରେ ଆକୋଲା ଛାତିବା ଏବଂ ଧାନ ସହିତ ସବୁଜ ସାର ଫସଲ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ଘାସ ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।
- ଖରାପିଆ ହବ କରାଯିବା ଓ ଖରିପ୍ ରତ୍ନ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅନାବନା ଘାସର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କମି ଯାଇଥାଏ ।
- ରୋଇବାର ତିନି ଦିନ ପରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରେଟିଲ୍‌କ୍ଲୋର (ଗଜା-ପୂର୍ବ ଘାସମରା ଔଷଧ) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- ଗଜା-ପୂର୍ବ ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ନଥିଲେ ରୋଇବାର ୧୫ ଦିନ ପରେ ହାତରେ ଘାସ ବାଛିଦେବା ଦରକାର ।
- ଅନାବନା ଘାସ ୨-୩ ପତ୍ରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଫଳ ଗଜା-ପର ଘାସମରା ଔଷଧ ହିସାବରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ବିସ୍‌ପିରିବାଲ୍ ସେଟିଅମ୍ କ୍ରିୟାଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ରୋଇବାର ୪୫ ଦିନ ପରେ ହାତରେ ଘାସ ବାଛିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଶୁଷ୍କ ବୁଣାଧାନରେ (କଳସେଚିତ ଓ ଅଣକଳସେଚିତ) ଅନାବନା ଘାସ ପରିଚାଳନା

- ବିହନରୁ ଗଜା ହେବାର ୧୫ ରୁ ୨୧ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଘାସବନ୍ଧା କରିବା ଦରକାର ।
- ପ୍ରଥମ ଥର ଘାସ ବାଛିବାର ୩୦-୪୫ ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଘାସ ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ବୁଣିବାର ୫ ଦିନ ପରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧ କି.ଗ୍ରା. ପେଣ୍ଡିମେଥାଲିନ୍ କିମ୍ବା ବୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଗଜାବର୍ଷା ହେବା ଦିନ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୦.୪୫ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରେଟିଲ୍‌କ୍ଲୋର + ସାଫନର୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏଥିସହିତ ବୁଣିବାର ୩୦ରୁ ୪୫ ଦିନ ପରେ ହାତରେ ଘାସ ବାଛିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଆର୍ତ୍ତ ବୁଣାଧାନରେ (କଳସେଚିତ ଓ ଅଣକଳସେଚିତ) ଅନାବନା ଘାସ ପରିଚାଳନା

- ଆର୍ତ୍ତ ବୁଣାଧାନକୁ କ୍ରମ ସିତ୍ତର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଣାଯିବ । ବୁଣିବାର ୧୦, ୨୦ ଓ ୩୦ ଦିନ ପରେ କୋନୋସ୍ପିଟର (ହସ୍ତଚାଳିତ ବା ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ) ଚଳାଇବା ଦରକାର ।
- ଆର୍ତ୍ତ ବୁଣାଧାନକୁ କ୍ରମସିତ୍ତର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଣାଯିବାର ୮ ଦିନ ପରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୦.୬୫ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରେଟିଲ୍‌କ୍ଲୋର (ଗଜା-ପୂର୍ବ ଘାସମରା ଔଷଧ) କିମ୍ବା ବୁଣିବାର ୩-୪ ଦିନ ପରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୦.୪୫ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରେଟିଲ୍‌କ୍ଲୋର + ସାଫନର୍ (ସୋପିଟ୍) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏଥିସହିତ ବୁଣିବାର ୪୦ ଦିନ ପରେ ହାତରେ ଘାସ ବାଛିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଘାସମରା ଔଷଧ	କେଉଁ ଘାସ ଦମନ ହେବ
ବିସ୍‌ପିରିବାଲ୍	ବୁଣି, ଚଉଡ଼ା ପତ୍ର ଘାସ ଓ ମୁଆଁ ଜାତୀୟ ଘାସ । ସୁଆଁ ଘାସ ଭଲ ଭାବରେ ଦମନ କରିଥାଏ ।
ପେନୋକ୍ଲୋରାମ୍	ବୁଣି, ଚଉଡ଼ା ପତ୍ର ଘାସ ଓ ମୁଆଁ ଜାତୀୟ ଘାସ
ଫେନୋକ୍ସାପ୍ରପ୍	ବୁଣି ଜାତୀୟ ଘାସ ଯଥା କାଉଗୋଡ଼ିଆ, ବଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି
ବିସ୍‌ପିରିବାଲ୍ + ପାଇରାକ୍ଲୋସମିଥ୍‌ରନ୍	ବୁଣି, ଚଉଡ଼ାପତ୍ର ଘାସ ଓ ମୁଆଁଜାତୀୟ ଘାସ ଦମନ କରେ । ସୁଆଁ, ମୁଆଁ ଓ ଅଧିକାଂଶ ଚଉଡ଼ାପତ୍ର ଘାସକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦମନ କରିଥାଏ ।
ଫେନୋକ୍ସାପ୍ରପ୍ + ଇଥାକ୍ସିସଲଫୁରନ୍	ବୁଣି, ଚଉଡ଼ା ପତ୍ର ଘାସ ଓ ମୁଆଁଜାତୀୟ ଘାସ
ପ୍ରେଟିଲ୍‌କ୍ଲୋର ସହିତ ସେଫନର୍ ଓ ଅକ୍ସାଡିଆଲିଲ୍ ଓ ବୁଟାକ୍ଲୋର	ବୁଣି, ଚଉଣା ପତ୍ର ଘାସ ଓ ମୁଆଁଜାତୀୟ ଘାସ

ଧାନ ଫସଲରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା

ଭୂଆଁ ଧାନରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା

- କାନ୍ଥୁଅ କରିବା ଓ ମଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।
- କାନ୍ଥୁଅ କରିବା ପରେ ସବୁଜ ସାର ଫସଲର ଗଛ ଭଲ ଭାବେ ସଢ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ୨.୫ ସେ.ମି. ପାଣି ରଖନ୍ତୁ । ଛଣି ପରି କମ୍ ତରୁ ଥିବା ଗଛ ପାଇଁ ୧୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ।
- ଚଳି ରୋଇବାବେଳେ ୨ ସେ.ମି. ଠିଆପାଣି ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ଅଧିକ ପାଣି ରହିଲେ ବେଶି ଗଜାବର୍ଷା ହେବ, ଫଳରେ ପିଲ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ରୋଇବାର ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨ ସେ.ମି. ଠିଆପାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ରୋଇବା ପରେ ଗଛର ଚେର ଧରିଗଲେ, ଅଦଳବଦଳ କରି କିଆରୀରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ଓ ଜମିକୁ ନିରିତା ରଖିବା ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ । ଫସଲର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରି କିଆରୀରେ ୫ ସେ.ମି. ଠିଆ ପାଣି ରଖାଯିବା ଦରକାର ।
- ଚେର ବଢ଼ିବା ଓ ପିଲ ହେବା ସମୟରେ ଜଳ ଅଭାବ ହେଲେ ଚେର ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ି ନପାରିବା ଯୋଗୁଁ ପିଲ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ ଓ ଅମଳ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।

ଆର୍ତ୍ତ ବୁଣାଧାନରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା

- ବୁଣିବା ପରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମତାଳ ମାଟିକୁ ଡବା ରଖନ୍ତୁ ।
- ଫସଲର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଜଳ ସ୍ତର ବଢ଼ାଇ ୨.୫ ସେ.ମି. ରଖନ୍ତୁ ।
- ବଳକା ପାଣି ନିରିତି ଯିବା ପାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଅଥବା କିଆରୀରୁ ପାଣି ଶୁଷ୍କା ପରଦିନ ପାଣି ମତାନ୍ତୁ । ଅମଳ ହେବାର ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଳସେଚନ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଶୁଷ୍କ ବୁଣାଧାନରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା

- ଧାତି ବୁଣା ଧାନ ଫସଲରେ ବୁଣିବାର ୧୦-୧୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳକା ବୃଷିକଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ପିଲ ହେବାବେଳେ ଜମିରେ ୨.୫ ସେ.ମି. ରୁ ଅଧିକ ପାଣି ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
- ଧାତି ବୁଣା ଧାନ ଫସଲରେ ବୁଣିବାର ୪୦ ଦିନ ପରେ ଠିଆପାଣି ଆଇ ଜମିରେ ହବ କରନ୍ତୁ । ଫସଲର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ କିଆରୀରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଷାଜଳ ଜମା କରି ରଖନ୍ତୁ ।

ଜଳ ଅପଚୟ ହ୍ରାସ କରିବାର ଉପାୟ

- ଭଲ ଭାବରେ କାନ୍ଥୁଅ କରି ଜମିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସମତୁଳ କଲେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଭେଦି ଜଳ ନଷ୍ଟ ହେବା କମି ଯାଇଥାଏ ।
- କୈବିକ ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ସବୁଜ ସାର ଫସଲ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପାକରଣ ଓ ମାଟି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଳ ଅପଚୟ ହେବା କମି ଯାଇଥାଏ ।
- ମାଟିରେ ଭେଦିବା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଅପଚୟ ରୋକିବା ପାଇଁ କୋନାଲ ଓ ପାଣି ନାଳରେ ଅଭରାହ୍ମାସକ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବେ ସମତଳ କରି ମାଟିକୁ ଜଳରେ ପରିପୁକ୍ତ କରି ରଖିଲେ ବାଷ୍ପାକରଣ କମିତ ଜଳ ଅପଚୟକୁ ଶତକଡ଼ା ୫୦ ଭାଗ କମା ଯାଇପାରିବ ।
- ବାଲିଆ ଜମିରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୫୦ ଘନ ମିଟର ହିସାବରେ କେଲୁଅ ମାଟି ବା ପୋଖରୀର ପତ୍ତାମଟି ପକାଇଲେ ମାଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିତ ଜଳ ଅପଚୟକୁ ଶତକଡ଼ା ୨୦-୨୫ ଭାଗ ହ୍ରାସ କରା ଯାଇପାରିବ ।